

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS - HUILA 2020

**LIBARDO PINTO LISCANO
ALCALDE MUNICIPAL
2020 - 2023**

**ANYELA PIEDAD MUÑOZ VILLARRAGA
DIRECTORA LOCAL DE SALUD**

**ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SALUD ALGECIRAS - HUILA
2020**

Contenido

PRESENTACIÓN	11
INTRODUCCIÓN.....	30
METODOLOGÍA	32
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	34
LISTA DE SIGLAS.....	35
1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO	37
1.1 Contexto Territorial.....	37
1.1.1 Localización.....	38
1.1.2 Características Físicas del Territorio.....	39
1.1.3 Accesibilidad geográfica	45
1.2 Contexto Demográfico.....	47
1.2.1 Estructura demográfica.....	50
1.2.2 Dinamica demografica	56
1.2.3 Movilidad forzada	59
1.2.4 Dinámica migratoria.....	61
2. CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES.....	65
2.1 Análisis de la mortalidad.....	65
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas.....	65
2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo	74
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	96
2.1.4 Mortalidad relacionada con salud mental.....	112
2.1.5 Mortalidad por covid	¡Error! Marcador no definido.
2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez.....	116
2.1.7 Identificación De Prioridades Identificadas Por Mortalidad General, Especifica Y Materno – Infantil Y De La Niñez.	129
2.2 Análisis De Morbilidad	131
2.2.1 Principales causas de morbilidad	131
2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo	140
2.2.3 Morbilidad especifica salud mental	182
2.2.4 Morbilidad eventos de alto costo	192
2.2.5 Morbilidad de eventos precursores.....	193
2.2.6 Morbilidad Población Migrante.....	194

2.2.8	Análisis de la Población en Condición de Discapacidad 2020.	202
2.2.9	Identificación de Prioridades Principales en la Morbilidad.....	205
2.2.10	Análisis de los determinantes sociales de la salud – DSS	207
3.	CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD	215
3.1	Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente	
	215	
3.2	Priorización de los Problemas de Salud.	215

LISTA DE TABLAS

TABLA 1.	DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS POR EXTENSIÓN TERRITORIAL Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2020	38
TABLA 2.	RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO POR ÁREA DE RESIDENCIA ALGECIRAS HUILA, 2019	42
TABLA 4.	TIEMPO DE TRASLADO, TIPO DE TRANSPORTE Y DISTANCIA EN KILÓMETROS DESDE EL MUNICIPIO HACIA LOS MUNICIPIOS VECINOS, 2020.....	45
TABLA 5	DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN ÁREA.....	47
TABLA 6.	POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2020.....	47
TABLA 7	VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS VHP CENSO 2018	49
TABLA 8	POBLACIÓN SEGÚN PERTENENCIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2020	50
TABLA 9	INDICADORES POBLACIONALES	51
TABLA 10	.PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CICLO VITAL, MUNICIPIO DEL ALGECIRAS 2005, 2020 Y 2023.	53
TABLA 11	POBLACIÓN POR GRUPO EDAD Y GÉNERO	54
TABLA 12	TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD MUNICIPIO DE ALGECIRAS	58
TABLA 13	VICTIMAS SEGÚN HECHO VICTIMIZANTE	60
TABLA 14	DESPLAZAMIENTO SEGUN GENERO Y EDAD.....	60
TABLA 15	MIGRANTES SEGUN PROCEDENCIA	62
TABLA 16	MIGRANTES SEGUN TIPO DE ATENCION.....	62
TABLA 17	MIGRANTES SEGUN AFILIACION	63
TABLA 18.	SEMAFORIZACIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR CAUSAS ESPECÍFICAS MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	94

TABLA 19. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y NIÑEZ, EN MENORES DE 1 AÑO SEGÚN LISTA DE LOS 16 GRANDES GRUPOS MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018 HOMBRES.	97
TABLA 20 TASA DE MORTALIDAD MUJERES MENORES DE 1 AÑO.....	98
TABLA 21 TASA DE MORTALIDAD MENORES DE 1 AÑO.....	99
TABLA 22. TASA DE MORTALIDAD DE 1 - A 4 AÑOS, HOMBRES SEGÚN LISTA DE LOS 16 GRANDES GRUPOS MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	99
TABLA 23 TASA MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS MUJERES, ALGECIRAS 2005-2018	100
TABLA 24 MORTALIDAD DE 1 A 4 AÑOS, ALGECIRAS 2005-2018.....	100
TABLA 25. TASA DE MORTALIDAD EN HOMBRES MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN LISTA DE LOS 16 GRANDES GRUPOS MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	101
TABLA 26 TASA DE MORTALIDAD EN MUJERES MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN LISTA DE LOS 16 GRANDES GRUPOS MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	101
TABLA 27 TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN LISTA DE LOS 16 GRANDES GRUPOS MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	102
TABLA 28. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	103
TABLA 29. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ POR NEOPLASIAS, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	104
TABLA 30. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018.....	105
TABLA 31. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2017	105
TABLA 32. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO, ENFERMEDADES DEL OÍDO Y APÓFISIS MASTOIDES, MUNICIPIO DE ALGECIRAS	106
TABLA 33. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	106
TABLA 34. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	107
TABLA 35. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	108
TABLA 36. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	110

TABLA 37. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR HALLAZGOS CLÍNICOS, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2017	111
TABLA 38. NÚMERO DE MUERTES EN LA INFANCIA Y NIÑEZ, POR CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2017	111
TABLA 39 MORTALIDAD EVENTOS RELACIONADOS CON SALUD MENTAL	112
TABLA 40 MORTALIDAD POR COVID SEGUN AMBITO.	115
TABLA 41 MORTALIDAD POR COVID SEGÚN COMORBILIDAD	115
TABLA 42. SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LA MORTALIDAD MATERNO – INFANTIL Y NIÑEZ, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005- 2018	117
TABLA 43. INDICADORES DE RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA Y LA TASA DE MORTALIDAD NEONATAL POR ETNIA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005 – 2018	122
TABLA 44. INDICADORES RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ÁREA DE RESIDENCIA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2009 – 2018	126
TABLA 45. INDICADORES RAZÓN DE MORTALIDAD NEONATAL POR ÁREA DE RESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2009 – 2018	127
TABLA 46 PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL....	128
TABLA 47 PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	129
TABLA 49. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES EN SALUD DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2018.....	129
TABLA 50. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2009 – 2019	132
TABLA 51. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN HOMBRES, MUNICIPIO DE ALGECIRAS	135
TABLA 52. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN MUJERES, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2009 – 2019 ..	138
TABLA 53 MORBILIDAD SEGUN SUBCAUSA Y GENERO 2019	141
TABLA 54. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA PRIMERA INFANCIA, TOTAL POBLACIÓN MUNICIPIO DE ALGECIRAS.....	142
TABLA 55 MORBILIDAD POR SUBCAUSA GÉNERO MASCULINO 2019.....	144
TABLA 56 MORBILIDAD POR SUBCAUSA GENERO FEMENINO 2019.....	146
TABLA 57. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA PRIMERA INFANCIA, POBLACIÓN MASCULINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	148
TABLA 58. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA PRIMERA INFANCIA, POBLACIÓN FEMENINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	151
TABLA 59. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA INFANCIA, TOTAL POBLACIÓN. MUNICIPIO DE ALGECIRAS.....	153

TABLA 60. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA INFANCIA, POBLACIÓN MASCULINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	155
TABLA 61. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA INFANCIA, POBLACIÓN FEMENINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	157
TABLA 62. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA, TOTAL POBLACIÓN. MUNICIPIO DE ALGECIRAS.....	159
TABLA 63. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA, POBLACIÓN MASCULINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	161
TABLA 64. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA ADOLESCENCIA, POBLACIÓN FEMENINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	163
TABLA 65. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA JUVENTUD, TOTAL POBLACIÓN. MUNICIPIO DE ALGECIRAS.....	165
TABLA 66. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA JUVENTUD, POBLACIÓN MASCULINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	167
TABLA 67. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA JUVENTUD, POBLACIÓN FEMENINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	169
TABLA 68. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA ADULTEZ. TOTAL POBLACIÓN. MUNICIPIO DE ALGECIRAS.....	171
TABLA 69. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA ADULTEZ. POBLACIÓN MASCULINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	173
TABLA 70. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA ADULTEZ. POBLACIÓN FEMENINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	175
TABLA 71. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA VEJEZ. TOTAL, POBLACIÓN. MUNICIPIO DE ALGECIRAS.....	177
TABLA 72. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA VEJEZ. POBLACIÓN MASCULINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	179
TABLA 73. MORBILIDAD ESPECÍFICA POR SUBGRUPO DE CAUSAS, CURSO DE VIDA VEJEZ. POBLACIÓN FEMENINA. MUNICIPIO DE ALGECIRAS	181
TABLA 74. MORBILIDAD EN SALUD MENTAL, TOTAL POR CURSO DE VIDA MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA 2009 – 2019	183
TABLA 75. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN SALUD MENTAL EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2009 - 2019.....	186

TABLA 76. PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN SALUD MENTAL EN MUJERES. MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2009 - 2019.....	189
TABLA 77. MORBILIDAD, CONSULTA EXTERNA ESE MUNICIPAL ALGECIRAS 2018. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
TABLA 78. MORBILIDAD, CONSULTA URGENCIAS ESE MUNICIPAL ALGECIRAS 2018. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
TABLA 79. MORBILIDAD, CONSULTA HOSPITALIZACIÓN ESE MUNICIPAL ALGECIRAS 2018..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
TABLA 80. MORBILIDAD, CONSULTA REFERENCIA ESE MUNICIPAL ALGECIRAS 2018. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
TABLA 81 SEMAFORIZACIÓN Y TENDENCIA DE LOS EVENTOS DE ALTO COSTO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2006 – 2018	192
TABLA 82. EVENTOS PRECURSORES, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2011 – 2018	193
TABLA 83. SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN MIGRANTE 2019	194
TABLA 84. LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 2019	195
TABLA 85 POBLACIÓN MIGRANTE ATENDIDA SEGÚN AFILIACIÓN AL SGSS.....	195
TABLA 86. TABLA DE SEMAFORIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2006 – 2018	197
TABLA 87. TABLA DE SEMAFORIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2006 – 2018	201
TABLA 88. DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTERACIONES PERMANENTES POR AÑO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2020.....	203
TABLA 89. DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTERACIONES PERMANENTES POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2018	204
TABLA 90. PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN LA MORBILIDAD, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2018.	205
TABLA 91. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - CONDICIONES DE VIDA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2019	207
TABLA 92. DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2006 – 2018	208
TABLA 93. TABLA. FACTORES PSICOLÓGICOS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2018.....	208
TABLA 94. TABLA. SISTEMA SANITARIO (10 INDICADORES) MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2019	209
TABLA 95. TABLA. SERVICIOS HABILITADOS EN LA IPS DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA 2018.....	211
TABLA 96. TABLA. SITUACIÓN POR RÉGIMEN Y ASEGURADORA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2018.....	211

TABLA 97. TABLA. OTROS INDICADORES DEL SISTEMA SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2018. 211

TABLA 98 DETERMINANTES INTERMEDIOS EDUCACIÓN 212

TABLA 99. TABLA. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, POR ÁREA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA .. 212

TABLA 100. PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2018. 215

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2020. 48

FIGURA 2 POBLACIÓN SEGÚN GENERO 2020..... 52

FIGURA 3 CAMBIO DE POBLACIÓN POR GRUPOS ETAREOS MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005-2020 53

FIGURA 4 POBLACION SEGUN EDAD Y GENERO - ALGECIRAS 2020 55

FIGURA 5 TASA DE CRECIMIENTO NATURAL, MORTALIDAD Y NATALIDAD MUNICIPIO DE ALGECIRAS. 56

FIGURA 6 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD MUNICIPIO DE ALGECIRAS..... 57

FIGURA 7 TASA DE FECUNDIDAD..... 58

FIGURA 8. ESPERANZA DE VIDA AL NACER, POR SEXO, DEPARTAMENTO DEL HUILA, 1885 – 2020..... 59

FIGURA 9 PIRAMIDE POBLACIONAL 61

FIGURA 10 MIGRANTES SEGUN AFILIACION 63

FIGURA 11 TASA AJUSTADA GRANDES CAUSAS TOTAL POBLACION..... 67

FIGURA 12. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018 67

FIGURA 13. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA MUJERES MUNICIPIO DE ALGECIRAS 68

FIGURA 14. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS – AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018 69

FIGURA 15. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS – AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018..... 70

FIGURA 16. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS – AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 EN MUJERES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018 71

FIGURA 17. TASA DE AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 AJUSTADA POR EDAD MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018 72

FIGURA 18. TASA DE AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 AJUSTADA POR EDAD EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	73
FIGURA 19. TASA DE AVPP POR GRANDES CAUSAS LISTA 6/67 AJUSTADA POR EDAD EN MUJERES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	74
FIGURA 20. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018.....	75
FIGURA 21. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN MUJERES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	76
FIGURA 22. TASAS DE MORTALIDAD AJUSTADA TOTAL, PARA LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005 – 2018.....	77
FIGURA 23. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS NEOPLASIAS EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	78
FIGURA 24. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS NEOPLASIAS EN MUJERES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	78
FIGURA 25. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA PARA LAS NEOPLASIAS, TOTAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005 - 2018.....	80
FIGURA 26. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018.....	81
FIGURA 27. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO EN MUJERES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	82
FIGURA 28. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA PARA LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO TOTAL, MUNICIPIO ALGECIRAS 2005 – 2018	83
FIGURA 29. NÚMERO DE CASOS PARA LAS ENFERMEDADES DEL PERIODO PERINATAL EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	85
FIGURA 30. NÚMERO DE CASOS PARA LAS CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005 -2018.....	86
FIGURA 31. NÚMERO DE CASOS PARA LAS CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL TOTAL DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005 -2018	87
FIGURA 32. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS CAUSAS EXTERNAS EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018.....	88
FIGURA 33. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS CAUSAS EXTERNAS EN MUJERES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018.....	89
FIGURA 34. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS CAUSAS EXTERNAS TOTAL, MUNICIPIO DE ALGECIRAS	90

FIGURA 35. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN HOMBRES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	90
FIGURA 36. TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD PARA LAS DEMÁS ENFERMEDADES EN MUJERES MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	91
FIGURA 37. TASA DE MORTALIDAD PARA LAS DEMÁS ENFERMEDADES TOTAL, MUNICIPIO DE ALGECIRAS HUILA 2005 - 2018	93
FIGURA 38 PIRÁMIDE POBLACIONAL	113
FIGURA 39. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 A 2018.....	118
FIGURA 40 TASA DE MORTALIDAD NEONATAL, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005 – 2018.....	118
FIGURA 41. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018.....	119
FIGURA 42. TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018.....	120
FIGURA 43. TASA DE MORTALIDAD POR EDA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	120
FIGURA 44. TASA DE MORTALIDAD POR IRA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018.....	121
FIGURA 45. TASA DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2005 – 2018	121
FIGURA 46 TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR ETNIA, MUNICIPIO ALGECIRAS 2009 – 2018	123
FIGURA 47. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL POR ETNIA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2009- 2018	123
FIGURA 48 MORTALIDAD MENOR DE 1 AÑO SEGÚN ETNIA	124
FIGURA 49 PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER.....	124
FIGURA 50 OTROS INDICADORES SEGÚN ETNIA.....	125
FIGURA 51 RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ÁREA DE RESIDENCIA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005 – 2018	126
FIGURA 52. RAZÓN DE MORTALIDAD NEONATAL POR ÁREA DE RESIDENCIA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2009 – 2018	127
FIGURA 53 TASA DE MORTALIDAD MENOR DE 1 AÑO SEGÚN AREA.....	127
FIGURA 54. PROGRESIÓN DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 2018	193
FIGURA 55 PIRAMIDE POBLACIONAL MIGRANTES ATENDIDOS 2019	194
FIGURA 56. RÉGIMEN DE AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE DEPARTAMENTO HUILA Y MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2019.	196
FIGURA 57 TASA INCIDENCIA DENGUE ALGECIRAS-HUILA.....	201
FIGURA 58 TASA DE INCIDENCIA DENGUE GRAVE ALGECIRAS-HUILA	201
FIGURA 59. PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2020	202
FIGURA 60. TASA DE DESEMPLEO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 2007 -2018.....	213

FIGURA 61. TASA DE SUBEMPLEO OBJETIVO Y SUBJETIVO, DEPARTAMENTO DEL HUILA 2007 - 2018 214

PRESENTACIÓN

Según la Resolución 1536 de 2015, el *Análisis de Situación de Salud (ASIS)*, se define como una metodología analítica-sintética que comprende diversos tipos de modelos explicativos, los cuales permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud enfermedad de la población en su territorio e identificar los riesgos y los determinantes de la salud que los generan. Por otra parte, la elaboración del *Análisis de Situación de Salud* es responsabilidad de las entidades territoriales de nivel departamental, distrital y municipal, a través de la implementación de herramientas y procedimientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

De acuerdo con los lineamientos, el *Análisis de Situación de Salud* debe contener los siguientes ejes temáticos: caracterización de los contextos territorial y demográfico, los efectos sobre la salud que involucran la morbilidad y la mortalidad; los determinantes de la salud y la priorización de los efectos, factores de riesgo y determinantes. De igual forma, la periodicidad del *Análisis de Situación de Salud* general con sus anexos en profundidad para cada dimensión del *Plan Decenal de Salud Pública*, debe realizarse cada cuatro (4) años y su actualización cada año, de acuerdo con la metodología definida por este ministerio.

En consecuencia, los análisis realizados a la problemática local y las soluciones priorizadas a la misma, mediante la implementación del *Plan de Desarrollo “Mejor sí es posible Algeciras”*, buscará consolidar la transformación multidimensional, sistemática, sostenible e incluyente de las fuerzas vivas del municipio de Algeciras, garantizando el acceso progresivo de sus habitantes a la garantía de sus derechos, con equidad y énfasis especial en la niñez y la adolescencia, a través de políticas y acciones con garantía de derechos, enfoque diferencial e incluyente sobre el desarrollo humano, la competitividad, productividad y el buen gobierno del municipio, que le permitan generar un modelo local que fortalezca la región, el departamento y la nación, con calidad de vida, oportunidades

sociales, económicas, convivencia pacífica y el desarrollo del espíritu empresarial de su población.

De este modo, el *Análisis de Situación de Salud* es una herramienta importante para la orientación de planes y políticas públicas en pro del beneficio de la comunidad, la cual como como es de esperarse, presenta riesgos y debilidades, pero también fortalezas y oportunidades propias de su región.

INTRODUCCIÓN

El *Análisis de Situación de Salud*, es una herramienta que permite estudiar la interacción entre las condiciones de vida, las causas y el nivel de los procesos en todas las escalas territoriales, políticas y sociales con el propósito de coadyuvar en la planeación de acciones dirigidas a intervenir los determinantes que limitan la salud pública en una comunidad, municipio o departamento. Para tal fin, el punto de partida fundamental del *Análisis de Situación de Salud*, es el estudio de los grupos poblacionales en todo su contexto, incluyendo variables como sexo, edad y nivel socioeconómico, entre otras, que directa o indirectamente pueden influir en la distribución desigual de las condiciones de vida.

Con relación a lo expuesto, el presente documento expone los resultados del *Análisis de Situación de Salud* del municipio de Algeciras, con base a los indicadores seleccionados como trazadores, permitiendo aportar evidencia objetiva y pertinente, para el fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la planificación y la conducción de políticas públicas en salud que faciliten el logro de objetivos comunes y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Por tal motivo, en el primer capítulo de este documento, se realiza la caracterización del contexto territorial y demográfico del municipio de Algeciras, exponiendo el comportamiento de una serie de indicadores que actúan como determinantes sociales de la salud y permiten identificar las necesidades sanitarias como insumo para la coordinación intersectorial y transectorial.

El segundo capítulo contiene el análisis de los efectos de la salud y sus determinantes. En él se detalla el componente de la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupo, materno infantil y de la niñez. Asimismo, se revisa el componente de morbilidad atendida y los determinantes sociales de la salud. Para tal fin, el análisis tiene en cuenta variables que causan gradientes de desigualdad entre grupos poblacionales como el área de residencia, sexo, nivel educativo y régimen de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) entre otras.

Por último, en el tercer capítulo se describen los principales efectos en salud identificados en los capítulos anteriores y se realiza la priorización de los mismos. Finalmente, el *Análisis de Situación de Salud* permite realizar un análisis progresivo y comparativo de la dimensión del problema y su grado de afectación comunitaria, razón por la cual, la actualización del presente documento de manera anual proporcionara una evaluación eficiente de los problemas comunitarios relacionándolos con los determinantes sociales que pueden afectar la dinámica salud – enfermedad en la población.

METODOLOGÍA

El *Análisis de Situación de Salud (ASIS)* del municipio de **Algeciras – Huila** se realizó con la información disponible para 2017-2018 en las fuentes oficiales del Sistema Integral de la protección Social (SISPRO), entendiendo los rezagos de información propios de cada base de datos consultada. Para la realización del proceso de consolidación análisis y priorización de las necesidades el ASIS se rige básicamente en tres procesos determinados de la siguiente manera: *Fase de caracterización del contexto territorial y demográfico*: el cual determina las condiciones propias de la localidad además profundiza en las condiciones propias del municipio; *abordaje de los efectos de salud y sus determinantes*: en este punto se toma como fuente de información la base de Datos SISPRO (Sistema Integral de la Protección Social), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) los cuales son el punto de partida para extraer información de salud como morbilidad, mortalidad, estadísticas vitales, aseguramiento, educación y condiciones de vida y *priorización de los eventos en salud*. Se debe revisar indicadores y apoyarse con base a los problemas más sentidos en la comunidad para poder lograr en un común acuerdo las acciones de intervención y los problemas de fondo de cada uno de las comunidades.

Para el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyecciones de población del censo del año 2005 y se empleó la información del período comprendido entre los años 2005 a 2018 para los indicadores demográficos. Para el análisis de la información de mortalidad de la población, se utilizó la información del período comprendido entre los años 2005 al 2017, de acuerdo con las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas por el DANE. Además, se usó la metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables epidemiológicas de persona, tiempo y lugar en los indicadores en salud calculados con medidas de frecuencia como incidencia, prevalencia, letalidad, tasas de mortalidad ajustadas, años de vida potencialmente perdidos (AVPP), razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza del 95% entre otros.

Es importante incluir a todos los involucrados en el proceso de planificación local y participativo para lograr el fortalecimiento de una cultura de participación al igual por parte

de los actores sociales e institucionales para que de esta manera tomen acciones mediante el suministro de información, además de fomentar en la población la organización y la participación social para el desarrollo en acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos y daños.

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

Se ofrece agradecimiento y reconocimiento a los funcionarios de la administración Municipal de **Algeciras – Huila**, quienes, gracias a su labor en pro de la salud pública, proporcionan herramientas indispensables en la implementación de planes y programas de gobierno para mejorar las condiciones de vida de su población.

LISTA DE SIGLAS

- ASIS:** Análisis de la Situación de Salud
- AVPP:** Años de Vida Potencialmente Perdidos
- CAC:** Cuenta de Alto Costo
- CIE10:** Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
- DANE:** Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- Dpto.:** Departamento
- DSS:** Determinantes Sociales de la Salud
- EDA:** Enfermedad Diarreica Aguda
- ESI:** Enfermedad Similar a la Influenza
- ESAVI:** Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización
- ERC:** Enfermedad Renal Crónica
- ETA:** Enfermedades Transmitidas por Alimentos
- ETS:** Enfermedades de Transmisión Sexual
- ETV:** Enfermedades de Transmitidas por Vectores
- HTA:** Hipertensión Arterial
- IC 95%:** Intervalo de Confianza al 95%
- INS:** Instituto Nacional de Salud
- IRA:** Infección Respiratoria Aguda
- IRAG:** Infección Respiratoria Aguda Grave
- LI:** Límite inferior
- LS:** Límite superior
- MEF:** Mujeres en edad fértil
- Mpio.:** Municipio
- MSPS:** Ministerio de Salud y Protección Social
- NBI:** Necesidades Básicas Insatisfechas
- No:** Número
- ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible
- OMS:** Organización Mundial de la Salud

OPS: Organización Panamericana de Salud

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional

PIB: Producto Interno Bruto

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública

TB: Tuberculosis

TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano.

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

1.1 Contexto Territorial

Algeciras es un municipio colombiano del departamento del Huila que se halla en un ramal de la cordillera andina.

A comienzos del año 1820 los hermanos Miguel y Gabriel Perdomo Buendía, en compañía de varios trabajadores, llegaron en busca de fortuna; ante el hallazgo de una enorme plantación de caucho y quina toman posesión en la margen derecha del río Neiva y abren el primer claro en la montaña. Este posible primer asentamiento es denominado “El paso”. Luego de un terremoto que se presentó en el año de 1827, la región fue arrasada por el desbordamiento del río Blanco, el Quebrazón y las Damas, trayendo como consecuencia devastación y la pérdida de todos los haberes de quienes habitaban las partes aledañas a estos ríos.

Las posteriores transformaciones dieron lugar a la formación del caserío de López en memoria del general y ex presidente de Colombia José Hilario López.

El nuevo corregimiento ante su constante desarrollo y laboriosidad de sus gentes, es erigido como municipio por la Honorable Asamblea del Huila, por medio de la Ordenanza No. 41 del 8 de abril de 1924, dándole el nombre de San Juanito, denominación que llevó hasta el 16 de junio de 1937, fecha en la que se le cambió el nombre por el de Algeciras, según Ordenanza Departamental No. 036, en honor al puerto Español de Algeciras en la Provincia de Cádiz en donde se había realizado la famosa conferencia que puso fin a un problema en la República de Marruecos.

El cambio de nombre, se le comunicó oficialmente a la comunidad, mediante una campaña, en la que todas las puertas de las casas amanecieron con el nombre de Algeciras escrito con tiza blanca.

Nombre del municipio: Algeciras - Huila

NIT: 891.180.024-0

Código DANE: 41020

Gentilicio: Algecireño

1.1.1 Localización


El municipio de Algeciras se encuentra ubicado al oriente del departamento, sobre la parte media del valle del Magdalena, enmarcada entre la cordillera oriental y un ramal de la misma, que nace en esta misma cordillera en el Valle de Miraflores al sur del municipio, colindando con el departamento del Caquetá y muere en el Cerro de San Juan al norte del municipio; cuenta con una extensión total de 567,7 km², altitud media de 1.528 m.s.n.m, temperatura promedio de 25 °C y se encuentra en las coordenadas latitud 2° 31' 19" Norte y longitud 75° 18' 52" Oeste.

Tabla 1. Distribución del Municipio de Algeciras por extensión territorial y área de residencia, 2020

Municipio	EXTENSIÓN URBANA		EXTENSIÓN RURAL		EXTENSIÓN TOTAL	
	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje	Extensión	Porcentaje
Algeciras	60 Km ²	10.6%	507.7 Km ²	89.4%	567.7 Km ²	100%

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Municipio Algeciras.

Mapa 1. División política y administrativa municipio de Algeciras, 2019



Fuente: Gobernación del Huila

Límites Geográficos

El municipio limita al norte con el municipio de Rivera y Campoalegre; al sur con el Municipio de Gigante y el Departamento del Caquetá; al oriente con el Departamento del Caquetá y al occidente con los Municipios de Campoalegre, Hobo y Gigante.

1.1.2 Características Físicas del Territorio

El Municipio de Algeciras, se encuentra ubicado al oriente del departamento del Huila, sobre la parte media del valle del Magdalena, enmarcada entre la cordillera oriental. Está situado a 2º, 31'59 de latitud norte y a 75º, 19' 1 de longitud oeste.

El área total del municipio es de 567.7 Km², La división política del municipio comprende, 61 Veredas, 3 centros poblados y 27 barrios los cuales se detallan a continuación:

Veredas: Alto Cielo, Altos de Río Neiva, Altos de Lejías, Andes sector los Medios, Arenosa sección de la Ceiba, Bajo Roble, Bella Vista, Buena Vista, Colón, El Bosque sector el Pedregal, El Bosque, El Kiosco, El Pomo, El Reflejo, El Roble, El Silencio, El Vergel, Ipiales, La Ensiada, La Ensiada sector la Torre, La Esperanza, La Florida, La Guadaleja, La Huecaza, La Laguna, La Perdiz, La Perdizita, La Primavera, Laguillas, Las Acacias vereda

los Andes, Las Brisas, Las Damitas, Las Morras, Las Palmas, Las Perlas, Líbano Occidente, Líbano Occidente sector la Cascajosa, Líbano Oriente, Los Andes, Los Naranjos Altos, Los Naranjos Bajos, Manzanares, Pinares, Quebradón Norte, Quebradón Sur sección la Esmeralda, Quebradón Sur sección la Danta, San Antonio, San José sector Bajo, San José Alto, San José sector la Argelia, Santa Clara sector Bajo, Santa Lucia, Santa Lucia sector San Pablo, Santuario, Satías, Sector Alto vereda Santa Clara, Sector la Gruta vereda los Andes, Sector Pando de la vereda el Roble, Termópilas, Tierra y Libertad, Villanueva.

Centros Poblados: El Paraíso, El Toro y la Arcadia.

Barrios: Abraham Palacios, Colinas de Casa Blanca, Cabrera, Centro, El Porvenir, Jorge Eliécer Gaitán, Villa Café, Plazas Alcid, San Juanito, Timanco, Voluntariado Social, Ciudad Jardín, Juan XXIII, La Floresta, La Gaitana, La Libertad, La Orquídea, San Pedro, Siete de Agosto, Villa del Prado, Las Mercedes, Ciudad Barranquilla, Simón Bolívar, Altos de Satías, Los Rosales y las Villas.

Extensión total: 567.7 Km²

Extensión área Rural: 507.7 Km²

Extensión área Urbana: 60 Km²

Altitud municipal: Entre 800 y 3.000 msnm con altitud media de 1.528 msnm

Temperatura Media: 25°C

Distancia de Referencia: a 370. Km de Bogotá D.C. - a 57 Km de Neiva

Altitud y relieve: El municipio presenta montañas, colinas y terrazas. El relieve, colinado y montañoso estructural plegado, incluye las montañas y las lomas cuya altura y forma se deben a plegamientos de las rocas superiores de la corteza terrestre, producto de la expansión de la misma y el desplazamiento de los continentes.

La falla de Algeciras, esta falla hace parte del sistema de fallas de Suaza - Garzón o Algeciras-Garzón, ubicado entre la Cordillera Oriental y el Valle del Magdalena, con orientación preferencial NNE-SSW. Esta falla atraviesa por el borde noroccidental de la cabecera municipal de Algeciras. Según Vergara (1994) esta falla tiene una longitud total aproximada de 60 Km con 35 Km de evidencias neo tectónica principalmente de tipo

morfológico; es una falla activa de rumbo deslizante, con movimiento en sentido lateral derecho.

Mapa 2. Relieve Municipio de Algeciras



Fuente: Google Maps, 2019

Hidrografía: Sus principales fuentes hídricas son el Río Neiva, Río Blanco, el Quebradón, los Negros, las Palomas, Legías, Quebrada la Perdiz y el Mosca.


Los ríos del municipio importantes para el departamento y en general para la cuenca alta del Magdalena son los siguientes:

Quebrada La Perdiz, nace en la cota 1.250 m.s.n.m al Nororiente de la cabecera de Algeciras cruzando por fuera del perímetro urbano, con patrón de drenaje recto, en su corto trayecto hasta su desembocadura al Río Neiva presenta un régimen torrencial con registros históricos.

Quebrada La Mosca, nace en la cota 1.700 m.s.n.m al Suroriente de Algeciras en las estribaciones de la Cordillera Oriental con patrón de drenaje dendrítico, pasa por el sector Nororiental del casco urbano y se une con la quebrada Satía al Noroccidente de la cabecera para luego desembocar al Río Neiva. Al igual que la quebrada La Perdiz tiene un régimen torrencial.

Quebrada Satías, esta quebrada nace en la cota 1.400 msnm al Suroriente de la cabecera con patrón de drenaje dendrítico, pasa por el costado Suroccidental hasta unirse al Norte con la quebrada La Mosca.

Mapa 3. Hidrografía del Municipio de Algeciras



Área	De origen natural	De origen antrópico
Urbana	1. Hidrometeorológicas: - Por inundación. - Por erosión del suelo	1. Atentados contra infraestructura de bienes y servicios. 2. Concentración masiva de personas. 3. Desplazamiento masivo de personas
	2. Edáfica - Remoción en masa.	1. Problemas de orden público 2. Contaminación fuentes hídricas, Atmosférica y subsuelo.
	3. Geológica - Amenaza sísmica	1. Atentados terroristas. 2. Estaciones de gasolina.
Rural	1. Edáfica: - Por erosión. - Por deslizamientos.	1. Manejo inadecuado cilindros de gas.
		2. Incendios forestales
		3. Contaminación hídrica.

Fuente: Cruz Roja Colombiana, 2010

Situaciones de emergencia Municipio de Algeciras


El municipio de Algeciras, en diferentes años ha presentado múltiples afectaciones en la infraestructura vial, infraestructura urbana, agropecuaria, acueducto y alcantarillado entre otros; relacionado con la temporada invernal que se presenta a nivel nacional y regional.

Por motivo de las fuertes lluvias que se presentan en diferentes épocas del año en el municipio se presenta el aumento en los caudales de los ríos Neiva, Blanco y Quebradon sur; a su vez en las quebradas La perdiz y Mosca; ocasionando la suspensión del suministro de agua por taponamiento de la bocatoma e inundaciones en algunos barrios de la cabecera municipal lo que origina que algunos habitantes sufrieran pérdida de muebles y enseres.

A nivel rural distintas vías sufren afectaciones en temporada de lluvia, como causa de taponamientos, derrumbes y pérdida de banca, dejando incomunicado con la cabecera municipal a las veredas Quebradon sur, Kiosco, Perlas, Paraíso, Termopilas y Vergel entre otras.

De acuerdo a registros en la administración municipal, en la zona rural agricultores sufren, afectaciones en sus cultivos y viviendas afectadas en temporadas de lluvia.

Mapa 4. Amenaza por Riesgo Municipio de Algeciras



Fuente: Oficina de Planeación Algeciras 2018

Temperatura media: El municipio de Algeciras presenta una temperatura media de 25 °C en su área urbana, aunque es de aclarar que esta zona del departamento del Huila presenta diversidad climática que va desde los 18 °C a 29 °C, en cuanto a humedad esta puede variar en el municipio desde el 70% al 90%

Clima: De acuerdo a los factores que condicionan el clima en la superficie terrestre, Algeciras presenta un clima particular de acuerdo a la latitud, altitud, vientos y los microclimas. Por lo tanto su temperatura promedio es de 25 °C, alcanzando temperaturas máximas de 32 °C en verano, en la zona baja y 20 °C de temperatura en las zonas altas.

El territorio de Algeciras está distribuido en los siguientes pisos térmicos:

- **Clima cálido:** 9.81 Ha; 12.7%; 800 msnm a 1.000 msnm
- **Clima templado:** 41.422 Ha; 58.3%; 1.000 msnm a 1.800 msnm
- **Clima frío:** 12.986 Ha; 18.3%; 1.800 msnm a 2.400 msnm
- **Zona de páramo:** 7.609 Ha; 10.7%; 2.400 msnm a 3.000 msnm

1.1.3 Accesibilidad geográfica

El terreno sobre el cual se encuentran los mayores asentamientos de Algeciras son de topografía accidentada principalmente los núcleos de la Arcadia, El toro y el Paraíso; sus tierras son aptas para la agricultura y la ganadería.

Vías de comunicación


Terrestres: Está compuesto por colectivos, taxis, buses escalera, camperos, camiones, automóviles y colectivos.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, 2020

Municipio	Municipio Vecino	Distancia en Kilómetros entre municipios	Tipo de transporte	Tiempo estimado de traslado entre municipios	
				Horas	Minutos
Algeciras	Neiva Capital	65.0	TERRESTRE	1	23
Algeciras	Campoalegre	27,9	TERRESTRE	0	40
Algeciras	Hobo	32,5	TERRESTRE	0	44

Fuente: Google Maps, 2020

Mapa 5. Vías de comunicación Municipio de Algeciras, 2019



Fuente: *rutadistancia.com 2019*

❖ Actividad económica

La economía del municipio, en su gran medida está representada en la producción agrícola y pecuaria. En este campo el municipio cuenta con gran variedad de cultivos entre los que se destacan café, frijol, arveja, maíz, tomate, habichuela, cebolla, cacao, plátano, caña de azúcar, naranja, guayaba, papaya, lulo, tomate, yuca, arracacha y tabaco entre otros.

Los productos más destacados en el municipio de Algeciras son el café con producción promedio anual de 4.125 toneladas y 5.750 hectáreas sembradas, el plátano con 2.840 toneladas, el banano con 369 toneladas, la granadilla con 806 toneladas, maracuyá con 747 toneladas, la caña con 660 toneladas, lulo con 572 toneladas, mora con 529 toneladas, Tomate de Árbol con 315 toneladas y Aguacate con 210 toneladas, siendo estos importantes en el Producto Interno Bruto - PIB del municipio, así como en la generación de oportunidades de empleo para la población del municipio y la región.

Con relación a la producción pecuaria, en el municipio de Algeciras se destaca la ganadería extensiva doble propósito y no tecnificada; ostentando una producción bovina aproximada del 3% respecto a la producción departamental; seguida por la producción porcina que

representa aproximadamente el 1.48%. Dentro de los sistemas productivos, también se encuentran la piscicultura basada en primer lugar en la producción de tilapia roja, seguida por sábalo, trucha, carpa y cachama; asimismo, otros sistemas productivos de menor cantidad de producción, como aves de engorde y/o postura y la apicultura.

1.2 Contexto Demográfico

❖ Población total

En el año 2020 Algeciras es un municipio conformado por 22575 habitantes, el 48.6% (10969) de la población habita en la cabecera y el 51.4% (11606) en la zona rural.

❖ Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

El municipio de Algeciras tiene un área de 567.7 km², para la distribución por zonas, el 51.4 % de los habitantes se ubican en el área rural (11606 habitantes) y el 48.6% en la cabecera municipal (10969), con respecto a la población proyectada para el 2020, la densidad poblacional aproximada es de 182 habitantes por kilómetro cuadrado en la zona urbana y 22.86 en la zona rural con un consolidado Municipal de 39.77 habitantes por KM cuadrado..

Tabla 4 Densidad poblacional, según área

Municipio	Extensión TOTAL Km2	EXTENSION URBANA Km2	EXTENSION RURAL Km2	Hbts por KM2 Urbano	Hbts por KM2 Rural	Hbts por KM2
Algeciras	567.7	60	507.7 Km ²	182.82	22.86	39.77

Fuente: DANE proyección censo 2018

Tabla 5. Población por área de residencia Municipio de Algeciras, 2020

Municipio	Población cabecera municipal		Población resto		Población total	Grado de urbanización
	Población	Porcentaje	Población	Porcentaje		
Algeciras	10969	48.6%	11606	51.4%	22575	48.6

Fuente: Dane

Mapa 5. Población por área de residencia del Municipio de Algeciras 2020





Figura 1. Población por área de residencia Municipio de Algeciras, 2020.




Fuente: DANE, Proyección poblacional censo 2018.

❖ Grado de urbanización

El Municipio para el año 2020, según proyección poblacional cuenta con un grado de urbanización del 48.6%, mientras que la población ubicada en la zona rural corresponde al 51.4%.

Mapa 6. Ubicación de los hogares Municipio de Algeciras, 2019



Fuente: DANE, 2005. Proyecciones de Población

Número de viviendas

Tabla 6 Viviendas, Hogares y Personas VHP censo 2018

	TOTAL	URBANA		RURAL	
		No.	%	No.	%
Viviendas	8028	4089	51%	3939	49%
Hogares	6700	3547	53%	3153	47%
Personas	20259	9973	49%	10286	51%
Personas por Hogar	3.02	2.81		3.26	

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

El Municipio de Algeciras según el censo de población y vivienda del año 2018 cuenta con 8028 viviendas de las cuales el 51% se encuentran localizadas en la zona urbana y el 49% restante en la zona rural.

Con respecto al número de hogares el 53% se encuentran en la zona urbana y el 47% en la rural.

En cuanto al número de personal por hogar es más alto en la zona rural donde el promedio es de 3.26.

Población por pertenencia étnica


Tabla 7 Población según Pertenencia del municipio de Algeciras 2020

Autoreconocimiento étnico	Casos	%	Acumulado %
Indígena	13	0.06%	0.06%
Gitano(a) o Rrom	1	0.00%	0.07%
Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)	23	0.11%	0.18%
Ningún grupo étnico	19 891	98.18%	98.37%
No informa	331	1.63%	100.00%
Total	20 259	100.00%	100.00%

Fuente: Censo Nacional de población y vivienda 2018

1.2.1 Estructura demográfica

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Algeciras, 2005, 2020, 2023



Fuente: proyección poblacional DANE 2018

Tabla 8 indicadores poblacionales

Índice Demográfico	Año		
	2005	2020	2023
Poblacion total	23,994	22,575	23,115
Poblacion Masculina	12,242	11,631	11,894
Poblacion femenina	11,752	10,944	11,221
Relación hombres:mujer	104.17	106.28	106
Razón niños:mujer	50	36	34
Indice de infancia	34	28	27
Indice de juventud	25	26	25
Indice de vejez	9	13	14
Indice de envejecimiento	28	45	50
Indice demografico de dependencia	70.73	58.23	57.98
Indice de dependencia infantil	58.77	44.48	43.03
Indice de dependencia mayores	11.96	13.75	14.95
Indice de Friz	191.35	157.84	150.94

Fuente: proyección poblacional DANE 2018

La pirámide poblacional de Algeciras es regresiva e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2020 comparado con el año 2005, los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el estrechamiento que representa a la población adulta mayor, además del descenso

de la mortalidad. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la población de edades más avanzadas.

Con respecto a los indicadores, la relación hombre mujer se evidencia un crecimiento de la relación a expensa de la población masculina.

La relación niños mujer, evidencia un notorio decrecimiento entre el indicador del año 2005 al correspondiente al año 2005 y se mantiene el comportamiento para el año 2023.


El índice de vejez todo lo contrario que ocurre la población infantil presenta un comportamiento ascendente.

Con relación a la dependencia, mientras la infantil decrece la de mayores se incrementa, lo que se relaciona directamente con el cambio demográfico, ya mencionado.

Población por Genero

Del total de la población 22575 el 51.5% (11631) de la población corresponde a género masculino y el 48.5% (10944) corresponde a género femenino.

FIGURA 2 Población según genero 2020



Fuente: proyección poblacional DANE 2018

Población por grupo de edad

Al igual que lo refiere la pirámide poblacional la concentración de población del Municipio se da en grupos de 14 a 26 años (18.4%) y 27 a 59 años (42.0%) para el 2013, indicando una amplia concentración de gente joven y adulta con edad

productiva optima, con un determinante social definido como lo es la ocupación del tiempo libre y la actividad laboral.


Tabla 9 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio del Algeciras 2005, 2020 y 2023.

	2005		2020		2023		COMPORTAMIENTO 2005-2020	
	No. Absoluto	Porcentaje	No. Absoluto	Porcentaje	No. Absoluto	Porcentaje	No. Absoluto	Porcentaje
PRIMERA INFANCIA 0-5 AÑOS	2891	12%	2365	10%	2304	10%	-587	-2%
INFANCIA DE 6 A 11	3179	14%	2604	12%	2620	11%	-559	-2%
ADOLESCENCIA 12 A 18	3435	15%	3178	14%	3161	14%	-274	-1%
JUVENTUD 14 A 26	5436	23%	5292	23%	5281	23%	-155	0%
ADULTEZ 27 A 59	8159	35%	8563	38%	8845	38%	686	3%
MAYOR DE 60 AÑOS	2278	10%	2836	13%	3151	14%	873	3%
TOTAL	23434		22575		23115			

* La población Total Huila es según DANE, no corresponde a la sumatoria de las poblaciones por ciclo vital por incluir edades iguales en dos grupos vitales.

Fuente: Proyecciones y retrospección DANE 2018

FIGURA 3 CAMBIO DE POBLACIÓN POR GRUPOS ETAREOS MUNICIPIO DE ALGECIRAS 2005-2020



Fuente: proyección poblacional DANE 2018

- Con respecto al peso porcentual de cada ciclo de vida con respecto al total de la población, el grupo poblacional que presenta mayor decrecimiento corresponde a los de primera infancia e infancia.
- El grupo poblacional que proyecta mayor crecimiento corresponde a la población de 27 a 59 años y la de mayor de 60 años.

POBLACION SEGÚN CICLO VITAL

- La población perteneciente al grupo de la primera infancia (0-5) para el año 2005 representó un 12% del total de población, presentado una disminución para el año 2020, con un decrecimiento de 2% entre los dos años de referencia.
- La población perteneciente al grupo de infancia (6-11) para el año 2005 representó un 14% del total de población, presentado disminución de 2% para el año 2020.
- La población perteneciente al grupo de adolescencia (12-18) para el año 2005 representó un 15% del total de población, presentado decrecimiento para el año 2020 en 1%.
- La población perteneciente al grupo de juventud (14-26) para el año 2005 representó un 23% del total de población, manteniendo dicho porcentaje para el año 2020.
- La población perteneciente al grupo de adultez (25-79) para el año 2005 representó un 35% del total de población, presentado un incremento para el año 2020 en 3%.
- La población perteneciente al grupo de mayores (60 y más) para el año 2005 representó un 10% del total de población, presentado incremento de 3% para el año 2020.

Tabla 10 POBLACIÓN POR GRUPO EDAD Y GÉNERO


	2005		2020		2023	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
0-4	12%	12%	8%	9%	8%	9%
5-9	12%	11%	9%	10%	9%	9%
10-14	11%	11%	10%	10%	10%	10%
15-19	10%	10%	10%	9%	10%	9%
20-24	8%	8%	9%	8%	9%	8%
25-29	7%	7%	7%	7%	7%	7%
30-34	6%	6%	6%	7%	7%	7%
35-39	6%	6%	6%	7%	6%	7%
40-44	6%	6%	6%	6%	6%	6%
45-49	5%	5%	5%	5%	5%	5%
50-54	4%	4%	5%	5%	5%	5%
55-59	3%	3%	5%	4%	5%	5%
60-64	3%	3%	4%	4%	4%	4%
65-69	3%	3%	3%	3%	3%	3%
70-74	2%	2%	2%	2%	2%	2%
75-79	1%	1%	2%	1%	2%	2%
80 Y MÁS	1%	1%	2%	2%	2%	2%

Fuente: Proyección y retrospección DANE censo 2018

Estableciendo un comportamiento poblacional por género y grupo de edad se evidencia que entre los años 2005 y 2020 la población masculina decrece en los rangos comprendidos en los menores de 14 años y crece en los rangos de edad mayor de 59 años.

Con respecto a la población femenina decrece en los grupos menores de 19 años y crece en los grupos a partir de los 50 años.

FIGURA 4 POBLACION SEGUN EDAD Y GENERO - ALGECIRAS 2020



Fuente DANE

A través del periodo verificado se evidencia que la estructura demográfica por género en cada uno de los grupos de edad presenta ligeras modificaciones entre los dos géneros, con una leve mayoría de hombres que se hace mas notoria en los rangos de edad comprendidos de 15 a 19 y de 20 a 24 años y en la población femenina


Otros Indicadores Demográficos

- **Razón hombre: mujer:** Se aprecia que el índice de relación Hombre presenta un comportamiento ascendente pasando de 104.17 en el año 2005 a 106.2 para el año 2020.
- **Razón de niños: mujer:** Esta razón niños mujer presenta un comportamiento descendente pasando de 50 en el año 2005 a 36 para el año 2020.

- **Índice de infancia:** tienden a la reducción, se relaciona con la transición poblacional en la cual tiende a disminuir la población joven e incrementa la población adulta. Este indicador paso de 34 el año 2005 a 28 en el 2020.
- **Índice de juventud:** El índice de juventud se mantiene estable durante todo el periodo verificado.
- **Índice de vejez:** según información para el año 2005 fue de 9 y de 13 para el año 2020 .
- **Índice de envejecimiento:** presenta un incremento pasando de 28 en el año 2005 a 45 en el año 2020.
- **Índice de dependencia:** Tiende a la reducción pasando de 70.7 en el año 2005 a 58.2 en el año 2020
- **Índice dependencia infantil:** Al igual que la dinámica poblacional tiende a la reducción de población joven pasando de 70.7 en el año 2005 a 58.2 en el año 2020.
- **Índice de dependencia de mayores:** Este indicador mide la relación que hay entre población de 15 a 64 años y los mayores de 65 mostrando que este indicador tiende al crecimiento para el Municipio pasando de 11.9 en el año 2005 a 13.7 en el año 2020.
- Con respecto al índice de Friz se evidencia que ha venido presentando una disminución progresiva lo cual implica que nuestra población se hace más longeva cada día más pasando de 191.35 en el año 2005 a 157.84 en el año 2020.

1.2.2 Dinamica demografica

FIGURA 5 TASA DE CRECIMIENTO NATURAL, MORTALIDAD Y NATALIDAD MUNICIPIO DE ALGECIRAS.



Fuente: Dane Censo poblacional 2018

Tasa bruta de natalidad: Para el año 2018 fue 14.52 presentando un crecimiento con respecto a la tasa reportada en el año 2017 que fue de 13.7.

Tasa bruta de mortalidad: Para el año 2018 reporta una tasa de 4.70 presentando crecimiento con respecto al año 2017 que fue de 4.02.


Tasa de crecimiento natural: como resultante de la interacción entre la natalidad y la mortalidad el crecimiento natural para el año 2018 fue de 9.82 presenta leve incremento con respecto al reportado para el año 2017 que fue de 9,75.

Fecundidad

La fecundidad es la realización efectiva de la fertilidad, es decir, la reproducción biológica en cualquier especie.

Para la especie humana la fecundidad representa la posibilidad de permanecer como especie en el planeta, la reproducción se encuentra fuertemente ligada a las condiciones sociales, culturales y económicas entre otras.

FIGURA 6 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD MUNICIPIO DE ALGECIRAS



Fuente: Estadísticas vitales DANE


El indicador presenta un comportamiento fluctuante durante el periodo evaluado presentando en el año 2018 incremento con respecto al comportamiento reportado en el año 2016 y 2017.

Tabla 11 TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD MUNICIPIO DE ALGECIRAS

Indicador	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	COMPORTAMIENTO
Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años	7.66	3.08	3.89	11.06	4.82	4.91	4.17	5.93	3.42	4.30	7.74	5.19	6.98	4.43	↓
Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años	136.80	146.66	132.14	108.94	118.30	124.25	101.39	88.26	90.01	102.30	99.53	86.75	86.37	104.61	↑
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 10 a 19 años	68.29	70.99	65.09	58.17	59.94	63.23	51.87	46.24	45.59	51.58	51.62	43.99	44.79	52.51	↑

Fuente: Población DANE, nacimientos SISPRO

FIGURA 7 TASA DE FECUNDIDAD




La tasa de fecundidad del grupo de 15 a 19 presenta un incremento importante con respecto a la vigencia anterior, lo que incrementa el indicador global de 10 a 19 años.

Esperanza de vida

La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

La esperanza de vida al nacer para el departamento del Huila va en incremento, debido quizás al mejoramiento de la actividad de vida de la población a la promoción de estilos de vida saludable a la prevención de eventos patológicos fulminante

FIGURA 8. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Departamento del Huila, 1885 – 2020




Fuente: Base de Datos Sispro 2013.

1.2.3 Movilidad forzada

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el Municipio de Algeciras, donde se identifican 629 desplazados; pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y sus efectos, como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.

Tabla 12 víctimas según hecho victimizante



Fuente: Registro único de Víctimas.

En esta tabla se observa que en el hecho victimizante de mayor presencia en el Municipio corresponde al desplazamiento forzado.

Tabla 13 Desplazamiento según género y edad

Grupo Edad	FEMENINO		MASCULINO		NR - NO REPORTADO	
	No.	%	No.	%	No.	%
De 0 a 04 años	70	2%	75	3%		
De 05 a 09 años	314	11%	304	11%		
De 10 a 14 años	394	13%	450	16%	6	29%
De 15 a 19 años	389	13%	380	14%	6	29%
De 20 a 24 años	413	14%	442	16%	4	19%
De 25 a 29 años	272	9%	217	8%	1	5%
De 30 a 34 años	236	8%	140	5%		
De 35 a 39 años	186	6%	138	5%		
De 40 a 44 años	133	4%	107	4%		
De 45 a 49 años	136	5%	101	4%		
De 50 a 54 años	111	4%	96	3%		
De 55 a 59 años	102	3%	73	3%		
De 60 a 64 años	69	2%	76	3%		
De 65 a 69 años	39	1%	58	2%		
De 70 a 74 años	33	1%	36	1%		
De 75 a 79 años	21	1%	25	1%		
De 80 años o más	37	1%	50	2%		
No Reportado	3	0%	1	0%	4	19%
TOTAL	2,958	100%	2,769	100%	21	100%

Fuente Registro Único de Víctimas

Del total de víctimas el 51.5% corresponde a la población femenina el 48.2% masculina y el 0.4% no registra género.

Con respecto a la edad tanto en la población femenina como masculina el mayor porcentaje se ubica en los grupos comprendidos entre 5 y 24 años.

Población victima LGTBI


Cifras de Enfoque Diferencial						
SEXO	HECHO	VICTIMAS OCURRENCIA	VICTIMAS DECLARACION	VICTIMAS UBICACION	SUJETOS DE ATENCION	EVENTOS
Intersexual	Amenaza	1	0	1	1	1
	Desplazamiento forzado	5	1	3	3	5
LGBTI	Acto terrorista / Atentados / Combates / Enfrentamientos / Hostigamientos	1	0	0	0	1
	Amenaza	3	1	1	1	4
	Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado	2	0	0	0	2
	Desplazamiento forzado	8	2	0	0	9

Fuente RUV

A la población LGTBI el evento que mas la afecta es el desplazamiento forzado, seguido de amenaza.

1.2.4 Dinámica migratoria

FIGURA 9 PIRAMIDE POBLACIONAL



Fuente SISPRO

Para el Municipio de Algeciras se reportan 3 migrantes de los cuales el mayor peso porcentual se registra en el grupo de 20 a 24 años en el femenino.

Tabla 14 MIGRANTES SEGUN PROCEDENCIA

ALGECIRAS	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		HUILA	País de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante 2019
		2019	Proporción			2019	Distribución	
ALGECIRAS	Brasil		0%	HUILA	Brasil	10	0%	0.0%
	Ecuador		0%		Ecuador	35	1%	0.0%
	Nicaragua		0%		Nicaragua	3	0%	0.0%
	Otros		0%		Otros	188	7%	0.0%
	Panamá		0%		Panamá	3	0%	0.0%
	Perú		0%		Perú	15	1%	0.0%
	República Bolivariana de Venezuela	5	100%		República Bolivariana de Venezuela	1917	76%	0.3%
	Sin identificador de país		0%		Sin identificador de país	364	14%	0.0%
	Total	5	100%		Total	2535	100%	0.2%

Fuente SISPRO

La totalidad de los migrantes del municipio corresponden a población procedente de la república de Venezuela.

Tabla 15 MIGRANTES SEGUN TIPO DE ATENCION

		HUILA				
ALGECIRAS	Tipo de atención	Total Migrantes atendidos ALGECIRAS		Total Migrantes atendidos HUILA		Concentración ALGECIRAS
		2019	Distribución	2019	Distribución	2019
ALGECIRAS	Consulta Externa		0%	1,992	32%	0.0%
	Servicios de urgencias	4	25%	690	11%	0.6%
	Hospitalización		0%	423	7%	0.0%
	Procedimientos	5	31%	1,898	30%	0.3%
	Medicamentos	5	31%	1,102	18%	0.5%
	Nacimientos	2	13%	167	3%	1.2%
	Total	16	100%	6,272	100%	0.3%


Fuente SISPRO

Tabla 16 Migrantes según afiliación

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud ALGECIRAS	%	Total de migrantes con atenciones en salud HUILA	%	Concentración
Contributivo		0.0	407	15.9	0.0%
Subsidiado		0.0	94	3.7	0.0%
No afiliada	5	100.0	1790	69.9	0.3%
Particular		0.0	165	6.4	0.0%
Otro		0.0	100	3.9	0.0%
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo		0.0	1	0.0	0.0%
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado		0.0		0.0	#¡DIV/0!
En desplazamiento no asegurado		0.0	5	0.2	0.0%
Sin dato		0.0		0.0	#¡DIV/0!
Total de migrantes atendidos	5	100	2562	100	0.2%

Fuente SISPRO

FIGURA 10 Migrantes según afiliación



CONCLUSIONES

El municipio de Algeciras, está ubicado al oriente del departamento del Huila, tiene un área de 567.7 km². Para el año 2019, el municipio de Algeciras cuenta con una población estimada de 22575 habitantes (51,42% hombres y 48,6% mujeres).

En cuanto a la distribución poblacional, a partir de censo poblacional se establece que el 51.4 % de los habitantes se ubican en el área rural (11606 habitantes) y el 48.6% en la cabecera municipal (10969).

La densidad poblacional para la zona urbana es de 182.8 habitantes por km cuadrado y de 22.86 en la zona rural con un consolidado global de 39.77.

Con relación a los riesgos, el municipio de Algeciras, está expuesto a deslizamientos, inundaciones, desplazamientos forzados, precipitaciones e incendios forestales y agrícolas, la posición tectónica del país y las características geológicas de la zona indican alta probabilidad de recurrencia de eventos sísmicos de magnitud importante. En diferentes estudios el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad Nacional identificaron la existencia de fallas geológicas que podrían afectar centros poblados de este municipio.

- La población del Municipio a través del periodo verificado evidencia transición, a través de disminución de la población menor de 18 años y crecimiento de la población adulta.
- Con respecto a la transición demográfica por curso de vida, el grupo poblacional que presenta mayor decrecimiento corresponde a los de primera infancia e infancia y los que presentan mayor crecimiento corresponde a la población adulta y la correspondiente a la vejez.
- Con respecto a la tasa de fecundidad del grupo de 15 a 19 presenta un incremento importante con respecto a la vigencia anterior
- La totalidad de población migrante atendida en el Municipio procede de la república de Venezuela.

- En el Municipio el hecho victimizante de mayor presencia corresponde al desplazamiento forzado
- Del total de víctimas el 51.5% corresponde a la población femenina el 48.2% masculina y el 0.4% no registra género, con respecto a la edad tanto en la población femenina como masculina el mayor porcentaje se ubica en los grupos comprendidos entre 5 y 24 años.
- En la dinámica poblacional el crecimiento natural para el año 2018 fue de 9.82 presenta leve incremento con respecto al reportado para el año 2017 que fue de 9,75, partiendo de que la mortalidad, al igual que la natalidad presenta incremento con respecto a la vigencia anterior.

2. CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad

La mortalidad se analiza con tasa por 1000.000 habitantes, de tal manera que todos los análisis e interpretaciones se realizan bajo esta constante.

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas

Ajuste de tasas por edad

Para el análisis de mortalidad se tomarán como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregará por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año 2018 según información entregada por la plataforma del sistema integral para la protección social (SISPRO).

Población Total

Para el año 2018 la principal causa de mortalidad se relaciona con patologías del sistema circulatorio con una tasa de 175.1 y un crecimiento de 29 fallecimientos por cada 100.000 hbts.

En segundo lugar se reportan la mortalidad por las demás causas con una tasa de 113.4 y un crecimiento de 21 fallecimientos por cada 100.000 hbts, en su orden se registra la mortalidad por neoplasias con una tasa de 54.3 y un comportamiento descendiente.


Hombres

Para el año 2018, la principal causa de defunción se relaciona con la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 114 y un comportamiento decreciente con respecto a la vigencia 2017 en 36 fallecimientos por cada 100.000 hbts, seguido de mortalidad por causas externas con una tasa de 116.8, un comportamiento creciente con respecto al año inmediatamente anterior en 75 fallecimientos por cada 100.000, posteriormente aparece la mortalidad por la demás causas con una tasa de 114 y un comportamiento ascendente con respecto al año 2017.

Mujeres


Para el año 2018, la principal causa de defunción se relaciona con la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 213 y un comportamiento creciente con respecto a la vigencia 2017 en 93 fallecimientos por cada 100.000 hbts, seguido de mortalidad por las demás causas con una tasa de 114.4, un comportamiento creciente con respecto al año inmediatamente anterior en 7 fallecimientos por cada 100.000, posteriormente aparece la mortalidad por neoplasias con una tasa de 55.2 y un comportamiento descendiente con respecto al año 2017

FIGURA 11 Tasa Ajustada Grandes Causas Total Poblacion




Fuente: SISPRO, 2020.

FIGURA 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020.

FIGURA 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para mujeres Municipio de Algeciras




Fuente: SISPRO, 2020.

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Como complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se presentan los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, en cual compara el comportamiento de la tendencia de la mortalidad entre los años 2005 a 2018; se analizan los cambios por sexo y las causas de mortalidad que presentan mayor incidencia sobre la mortalidad prematura estimada a través de los AVPP.

Figura 14. Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020

AVPP Total

La mortalidad por demás causas aportó el 27% del total de años de vida potencialmente perdidos y presentó un crecimiento 44%, seguido de las causas externas que aportaron el 24% y crecieron en 85% con respecto al año 2017, las enfermedades del sistema circulatorio aportaron el 23% y crecieron en un 18%, las neoplasias aportaron el 12% y decrecieron en 55% con respecto a la anterior vigencia.

Figura 15. Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020

AVVP HOMBRES

En la población masculina la mortalidad por causas externas aportó el 43% del total de años de vida potencialmente perdidos y presentó un crecimiento 69%, con respecto al año 2017, seguido de las demás causas que aportaron el 22% y crecieron en 133% con respecto al año 2017, las enfermedades del sistema circulatorio aportaron el 12% y decrecieron en un 34%, la neoplasias y las enfermedades transmisibles aportaron el 7%, cada una.

AVPP Mujeres

Figura 16. Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020

AVPP MUJERES

En la población femenina la mortalidad por enfermedad del sistema circulatorio aportó el 37% del total de años de vida potencialmente perdidos y presentó un crecimiento 78%, con respecto al año 2017, seguido de las demás causas que aportaron el 35% y crecieron en 3% con respecto al año 2017, las neoplasias, aportaron el 18% y decrecieron en 42% y las enfermedades transmisibles aportaron el 5%.

Tasas ajustadas de Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP

Figura 17. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada por edad Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020.

Poblacion Total


Para la vigencia 2018 las de mayor presencia corresponde a las demás causas con una tasa de 2509.66, presentando incremento con respecto al indicador de la vigencia 2017.

En segundo lugar, aparecen las causas externas con una tasa de 2394.53, con un comportamiento ascendente.

En su orden se registran las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 2165 y un comportamiento ascendente con respecto al año 2017, las neoplasias con una tasa de 1091 y comportamiento decreciente.

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres

Figura 18. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada por edad en Hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020.

Hombres


En la población masculina, Para la vigencia 2018 la causa de mayor presencia corresponde a las causas externas que han presentado con relación al año 2017 un comportamiento creciente con una tasa de 4654.9.

En segundo lugar, aparecen las demás causas con una tasa de 2109,98 y un comportamiento ascendente con respecto al año 2017.

En su orden se registran las enfermedades trasmisible con una tasa de 1174.41 y un comportamiento descendente con respecto al indicador del año 2017, las enfermedades transmisibles con una tasa de 767 y las neoplasias con 661.9.

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres

Figura 19. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada por edad en Mujeres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020

Mujeres

En la población femenina, para el año 2018 la tasa con mayor presencia corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio con un indicador de 3200.67 y un comportamiento creciente frente al reportado en el año 2017, en su orden las demás enfermedades que reportan una tasa de 2944.1 y un comportamiento ascendente con respecto al año inmediatamente anterior, las neoplasias reportan una tasa de 1544.27 y decrecimiento con respecto al año anterior.


2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo

Tasas ajustadas por edad

Se realiza un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las causas dentro los seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. El análisis se realizará por género masculino y femenino

Enfermedades transmisibles


Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020

Las infecciones respiratorias agudas dentro de las enfermedades transmisibles han presentado la mayor tasa de mortalidad en los hombres del municipio en los años 2005 a 2018. Manteniéndose en el año 2018 con una tasa de 17.57 por 100.000 habitantes, con un comportamiento ascendente con respecto al año anterior, de igual manera se reporta mortalidad por enfermedad VIH (sida), con una tasa de 7.8.


Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 200

La población femenina para el año 2018, registra mortalidad por infección respiratoria aguda con una tasa de 13.9 por 100000 hbts con incremento frente a la ausencia en la anterior vigencia, de igual manera se reporta mortalidad por VIH con tasa de 10.6; evento que de igual manera no hacia presencia desde el año 2013.

Figura 22. Tasas de Mortalidad Ajustada Total, para las Enfermedades Transmisibles Municipio de Algeciras 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020

Para la población total, se identifica, que, en el subgrupo de trasmisibles, las infecciones respiratorias agudas son las que más mortalidad han registrado de manera consecutiva 2005 a 2018, para el año 2018 reporto una tasa de 10.06 y un crecimiento de 8 fallecimientos por cada 100000 hbts, con respecto al año 2017.

También se registra defunción por VIH-SIDA con una tasa de 9.23 con presencia en ambos géneros.

Neoplasias


Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020

Para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2018 en la población de hombres el tumor maligno del estómago ha aportado el mayor número de muertes, en el año 2018 se registró la tasa más alta con 46.4 por 100.000 habitantes, con un decrecimiento con respecto al año 2017 de 18 fallecimientos por cada 100000 hbts, seguido de Tumor maligno de colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de 6.84, evento que no hacía presencia desde el año 2006.


Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2019

En la población femenina para los años analizados se ha presentado mortalidad para todas las neoplasias, con diferentes valores y presentación irregular; para el año 2018 la tasa más alta corresponde a tumor maligno de cuello del útero con una tasa de 24.1 y un comportamiento ascendente con respecto al año 2017 en 7 fallecimientos por cada 100000 hbs, en su orden se registra la mortalidad por tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 16.22 y con un crecimiento en 9 fallecimientos por cada 100000 hbs con respecto al año 2017, tanto la mortalidad por leucemia como por tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón reportan una tasa de 7.45.

Figura 25. Tasa de Mortalidad Ajustada para las Neoplasias, Total del Municipio de Algeciras 2005 - 2018



Fuente: SISPRO, 2019


El municipio de Algeciras ha presentado tasas de mortalidad por neoplasias por todas las causas de acuerdo a la clasificación 6/67, en los más representativos están; el tumor de cuello del útero con una tasa de 24,1, seguido del tumor maligno del estómago; evento que como ya se mencionó hace presencia a través de la totalidad de periodo verificado. De igual manera se reporta el tumor maligno por de otras localizaciones y la no especificadas, el

tumor de la traquea, bronquios y pulmón y la leucemia y tumor de colon con una tasa de 3.5 para cada uno de los eventos.

para el año 2018 la tasa más alta corresponde a tumor maligno de cuello del útero con una tasa de 24.1 y un comportamiento ascendente con respecto al año 2017 en 7 fallecimientos por cada 100000 hbts, en su orden se registra la mortalidad por tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 16.22 y con un crecimiento en 9 fallecimientos por cada 100000 hbts con respecto al año 2017, tanto la mortalidad por leucemia como por tumor maligno de la traquea, bronquios y pulmón reportan una tasa de 7.45.

Enfermedades del sistema circulatorio

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020

En la población masculina la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio sobresale con mayor magnitud las enfermedades isquémicas del corazón, se ha presentado en todos los años de estudio manteniéndose como la primera causa, en el 2010 registra su mayor incidencia con una tasa de 200,46 por 100.000 habitantes, para el 2018 registra una tasa de mortalidad de 71.9 por 100.000 habitantes, cifra que presento un leve decrecimiento en comparación con el año anterior.

La enfermedad hipertensiva aparece como segunda causa en 2018, con una tasa de 28,7, evento que se ha presentado de manera consecutiva desde el 2008. En tercer lugar, la Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, con una tasa de 24.7. Las enfermedades cerebrovasculares también registran mortalidad para todos los años de estudio, disminuyendo de manera significativa para el 2018 con una tasa de 7,19 por 100.000 habitantes, siendo la más baja registrada.

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020.

En la población Femenina, al igual que la masculina las enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de mortalidad en los años analizados, su pico más alto lo presento en el año 2010 con una tasa de 160,22 por 100.000 habitantes, en el año 2018 la tasa fue de 104, presentando de nuevo crecimiento con respecto al comportamiento del año 2017 cuando presento una tasa de 43.71.

Las enfermedades cerebro vascular están como segunda causa, la cual se ha venido presentando de manera consecutiva desde el 2005 el pico más alto se presentó en el año 2006 con una tasa de 109,66 por 100.000 habitantes, para el 2018 registro una tasa de 73 la cual creció en comparación con el año anterior, cuando presento una tasa de 30.02.

Las enfermedades hipertensivas también han tenido un comportamiento similar, para el año 2018 como tercera causa de mortalidad con una tasa de 35.9 por 100.000 habitantes, con un comportamiento ascendente con respecto al año 2017..

Figura 28. Tasa de Mortalidad Ajustada para las Enfermedades del Sistema Circulatorio Total, Municipio Algeciras 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020.

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con respecto a los otros grandes grupos.


En el municipio de Algeciras durante el periodo comprendido entre los años 2005 a 2018, este grupo de enfermedades representó la primera causa de mortalidad general con predominio en población de mujeres.

Dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio, la primera causa de mortalidad es la enfermedad isquémica del corazón, la cual presenta una tendencia oscilante en las tasas de mortalidad con algunos picos importantes durante el periodo analizado; la tasa de mortalidad más alta se registró en el año 2010 con 181,3 casos por cada 100.000 habitantes, el comportamiento del año 2018 fue ascendente con respecto al año 2017. La segunda causa es la enfermedad cerebro vascular la cual alcanzo un pico en la tasa de mortalidad de 98,5 casos por 100.000 habitantes en el año 2006, en el año 2018 el evento crecio en comparación al año anterior, seguida de las enfermedades hipertensivas que registran un pico en la tasa de mortalidad de 29,4 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2008.

Estas enfermedades tienen factores de riesgo comunes que se relacionan con los estilos de vida de cada persona y requieren implementar programas de atención individuales y colectivos que busquen el fomento de hábitos de vida saludables y a la vez eliminen las barreras de atención, de tal forma que permitan la detección temprana de este tipo de enfermedades para prevenir la mortalidad causada por este grupo de enfermedades.

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal


Figura 29. Número de casos para las enfermedades del periodo perinatal en hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020.

En la población masculina, la mortalidad por ciertas afecciones del periodo perinatal, se han presentado algunos casos de manera muy ocasional, los trastornos respiratorios del periodo perinatal se han presentado en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2012 y 2013. Seguido están el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal presentándose en los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2015 con un caso en cada año. Para el año 2018 se reportó 1 mortalidad en Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas, traumatismo del nacimiento.


Figura 30. Número de casos para las Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Perinatal en Mujeres del Municipio de Algeciras 2005 -2018



Fuente: SISPRO, 2020.

Los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, son las afecciones que más han registrado mortalidad en la población femenina, la sepsis bacteriana del recién nacido registro mortalidad en el año 2008 y el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2010. Desde el año 2014 no se registra evento de mortalidad para ninguno de los eventos de afecciones perinatales en la población femenina.

Figura 31. Número de casos para las Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Perinatal Total del Municipio de Algeciras 2005 -2018



Fuente: SISPRO, 2020.


El grupo de afecciones originadas en el periodo perinatal abarca seis sub grupos de los cuales se evidencia que los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal son la principal causa de mortalidad con un comportamiento variable según el periodo de estudio registrando.

Se observa que para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2017 en los hombres los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal con 13 eventos representan el mayor número de muertes, seguido del resto de ciertas afecciones registradas en el periodo perinatal. Para el caso de las mujeres, los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal representan la mayor causa de mortalidad con 8 eventos.

La dinámica de la mortalidad en el periodo perinatal obedece en su mayoría a complicaciones del sistema respiratorio y ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, las cuales son la principal causa de mortalidad en este grupo de enfermedades en la población del municipio de Algeciras.

Causas externas

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020

Para la población masculina, en el año 2018 la mortalidad por causa externa de mayor presencia fue homicidios con una tasa de 56.8, este evento ha estado presente durante todo el periodo verificado con un comportamiento fluctuante.

En segundo lugar se reporta la mortalidad por lesión no determinada con una tasa de 18.87 y un comportamiento ascendente con respecto al año 2017, este evento se encontró ausente durante los años 2015 y 2016, la presencia más fuerte se presentó en el año 2008.

Posteriormente se reporta, los demás accidentes con una tasa de 17.3, después de 5 años de ausencia, la mortalidad por caídas con la tasa de 16.8, evento ausente desde el año 2010,


Figura 33. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020

En la población femenina para el año 2018 se registra como única causa de mortalidad los eventos de intención no determinada.

Figura 34. Tasa de Mortalidad para las Causas Externas Total, Municipio de Algeciras 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020

En el grupo de las causas externas abarcan 14 sub grupos de los cuales para el año 2018 la principal causa se relaciona con las agresiones u homicidas con una tasa de 29.1, con un comportamiento ascendente con respecto al indicador anterior y con presencia en toda la vigencia estudiada, en su orden se registra la mortalidad por eventos de intención no determinada que ha presentado un comportamiento fluctuante en todo el periodo verificado con ausencia en los años 2005 y 2013, caídas con una tasa de 8.49 y ausencia en el año 2017.

Las demás causas


Figura 35. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020

Para la población masculina la tasa de mortalidad de los eventos incluidos en las demás enfermedades, la de mayor magnitud para el año 2018 las enfermedades del sistema urinario que presentaron una tasa de 31.9 y un crecimiento de 15 fallecimientos por cada 100000 hbts con respecto al año 2017 y con su presencia más fuerte en el año 2012, a continuación aparece la mortalidad por el resto de enfermedades del sistema digestivo, con incremento en 10 fallecimientos por cada 100000 hbts, con respecto al año anterior, las enfermedades crónica de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 21.3 y un comportamiento ascendente con respecto al año anterior, las deficiencias nutricionales presentaron una tasa de 16.2 y de igual manera presentaron comportamiento ascendente.


Figura 36. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020

En la población femenina las mortalidades por las demás enfermedades, las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores han hecho presencia en toda la vigencia estudiada con excepción del año 2012 y su presencia mas fuerte en el año 2007. Seguido del resto de enfermedades con una tasa de 18.43 y ausencia en los dos años anteriores .


Figura 37. Tasa de Mortalidad para las Demás Enfermedades Total, Municipio de Algeciras Huila 2005 - 2018



Fuente: SISPRO, 2020

El grupo de las demás causas está conformado por 14 sub grupos, dentro de los cuales el evento que represento la mayor causa de mortalidad en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2018 fueron las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores la cual registro una tasa de 27.92 muertes por cada 100.000 habitantes, evento que hace presencia durante todo el periodo evaluado, seguido de las enfermedades del sistema urinario con una tasa de 19.3 y que de igual manera ha hecho presencia permanente, igual situación ocurre con la mortalidad por enfermedades del sistema digestivo con una tasa de 18.8.


FIGURA 38 Tasa de mortalidad por signos, síntomas y afecciones mal definidas Hombres



Fuente: SISPRO, 2020

El comportamiento del evento ha sido fluctuante con su mayor pico en el año 2010, seguido de 2018 y 2006.


FIGURA 39 Tasa de mortalidad por signos, síntomas y afecciones mal definidas mujeres 2018.



Fuente: SISPRO, 2020

El comportamiento del evento ha sido fluctuante con su mayor pico en el año 2007, seguido de 2016 y 2005.

FIGURA 40 Tasa de Mortalidad por signos, síntomas y afecciones mal definidas 2018



Fuente: SISPRO, 2020

El comportamiento del evento ha sido fluctuante con su mayor pico en el año 2010, seguido de 2018 y 2007.

Tabla 17. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Causa de muerte	HUILA	ALGECIRAS	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre	21.16	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama	12.89	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino	6.20	24.13	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata	15.97	0.00	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago	17.82	23.71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus	19.66	7.01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas intencionalmente	5.96	0.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del comportamiento	2.45	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)	20.30	29.15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad específica por edad por malaria	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles	38.31	25.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: SISPRO, 2020.

En la tabla de semaforización de mortalidad por causas específicas del municipio de Algeciras, para el año 2018, registra diferencia significativamente en comparación con el departamento en el evento de Tumor maligno del cuello del útero con una tasa de 24.13 por 100.000 habitantes para el municipio en comparación del departamento que está en 6,20, este evento presentó un aumento en el municipio en comparación con el año 2017. La mortalidad para los eventos de tumor maligno de estomago y homicidios a pesar de no presentar una diferencia estadística muy significativa, si presenta indicadores superiores en el Municipio con respecto a los reportados para el Departamento.

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez para el municipio de Algeciras se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.

Causas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará tomando como base las causas específicas de mortalidad para el municipio de Algeciras ocurridas en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2017, en los diferentes grupos de edad, teniendo en cuenta el sexo y la distribución de las causas de muerte por grandes grupos y subgrupos de mortalidad.

Menores de 1 año

Tabla 18. Tasa de mortalidad infantil y niñez, en menores de 1 año según lista de los 16 grandes grupos Municipio de Algeciras, 2005 – 2018 Hombres.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias						4.93							0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	3.88												0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3.88													
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio														
Enfermedades del sistema digestivo										4.98			0.00	
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7.75	7.35	16.06	4.24	20.92	4.93		6.49			11.11		0.00	5.46
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas				4.24	8.37	9.85	5.18			4.98	11.11	6.02	6.29	5.46
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio														
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad							5.18						0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2020.

En la población masculina la mortalidad en el año 2018 se relaciono con las afecciones originada en el periodo perinatal y las anomalías congénita, deformidades y anomalías cromosómicas cada una con tasa de 5.46 por 100000 con comportamiento fluctuante a través del periodo verificado.

Tabla 19 Tasa de Mortalidad mujeres menores de 1 año

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias						4.78						7.04	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)									5.49				0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas														
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio			4.12							5.71			0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo					4.90								0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	8.30	7.19	4.12	16.46	9.80			5.29	5.49				0.00	0.00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	4.15							5.29	5.49	11.43	9.66		5.56	5.71
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio														
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad		10.79			4.90								0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2020

En la población femenina en la vigencia 2018 se reportó mortalidad relacionada con malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que presentó un ligero incremento con respecto a año inmediatamente anterior, este evento en el transcurso del periodo verificado ha presentado fluctuaciones permanentes.

Tabla 20 Tasa de Mortalidad menores de 1 año

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias						4.85						3.25	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	2.00								2.75				0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.00												0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio			2.03								2.66		0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo					2.26						2.66		0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	8.02	7.27	10.16	10.44	15.80	2.43		5.83	2.75		5.17		0.00	2.79
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2.00			2.09	4.51	4.85	2.49	2.92	2.75	7.98	10.34	3.25	5.90	5.59
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio														
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad		5.45			2.26		2.49						0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2020

En la población menor de 1 año la principal causa de mortalidad se asocia con las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, evento que presentó su mayor indicador en los años 2009 y 2010, con presencia continua a partir del año 2008.

Menores de 1 a 4 años

Tabla 21. Tasa de mortalidad de 1 - a 4 años, hombres según lista de los 16 grandes grupos Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias														
Tumores (neoplasias)														
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	85.03												0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio												99.70	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo														
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal														
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas														
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio														
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad	85.03						89.45						0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2020.

No se reportaron eventos en el año 2018, el ultimo evento se reporto en el año 2016.

Tabla 22 Tasa mortalidad de 1 a 4 años mujeres, Algeciras 2005-2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias					91.32								0.00	0.00
Tumores (neoplasias)														
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas														
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio														
Enfermedades del sistema digestivo														
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal														
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas												100.20	0.00	0.00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio														
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad														

Fuente: SISPRO, 2020.

No se reportaron eventos en el año 2018, el ultimo evento se reportó en el año 2016.

Tabla 23 Mortalidad de 1 a 4 años, Algeciras 2005-2018.

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias					4.80								0.00	0.00
Tumores (neoplasias)														
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	42.52												0.00	0.00
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas														
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio		86.51						96.62					0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo														
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal														
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas												48.69	0.00	0.00
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio														
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad	42.52						45.93						0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2020.

Menores de 5 años

Tabla 24. Tasa de mortalidad en hombres menores de 5 años, según lista de los 16 grandes grupos Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Hombres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias						71.02							0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	67.57												0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	135.14												0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio												75.41	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo														
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	135.14	136.80	276.05	69.64	351.32	71.02		7231%			149.14		0.00	77.04
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas				69.64	140.55	142.05	71.68			73.80	149.14	75.41	76.28	77.04
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio														
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad	67.57						143.37						0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2020.

Los hombres menores de 5 años presentan defunción por malformaciones congénita, deformidades y anomalías cromosómicas, con tasa de 77.04 con un ligero decrecimiento con relación a la vigencia anterior, este evento ha estado ausente en los años 2011,2013,2014 y 2016 y su mayor presencia fue en el año 2009, de igual manera se reporta defunción por afecciones originadas en el periodo perinatal, con igual tasa.

Tabla 25 Tasa de mortalidad en mujeres menores de 5 años, según lista de los 16 grandes grupos Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Mujeres													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias					72.89	74.63						79.68	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)									77.40				0.00	0.00
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas														
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio		68.49	69.74						77.40	78.13			0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo					72.89								0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	134.77	136.99	69.74	285.10	145.77			7669%	77.40				0.00	0.00
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	67.39							7669%	77.40	136.25	137.85		80.45	81.43
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio												79.68	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad		205.48			72.89								0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2020.

En la población femenina se reporta defunción por malformaciones congénita, deformidades y anomalías cromosómicas, con tasa de 81.43 con un leve crecimiento con respecto a la vigencia anterior.

Tabla 26 Tasa de mortalidad en menores de 5 años, según lista de los 16 grandes grupos Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño	Total													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias					35.78	72.78						38.74	0.00	0.00
Tumores (neoplasias)	33.74								37.58				0.00	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos														
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	67.48												0.00	0.00
Enfermedades del sistema nervioso														
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides														
Enfermedades del sistema circulatorio														
Enfermedades del sistema respiratorio		34.22	34.69						37.58	37.95		38.74	0.00	0.00
Enfermedades del sistema digestivo					35.78					37.95			0.00	0.00
Enfermedades del sistema genitourinario														
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	134.95	136.89	173.43	176.12	250.45	36.39		7443%	37.58		76.69		0.00	39.59
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	33.74			35.22	71.56	72.78	36.82	3722%	37.58	113.85	153.37	38.74	78.31	79.18
Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio												38.74	0.00	0.00
Todas las demás enfermedades														
Causas externas de morbilidad y mortalidad	33.74	102.67			35.78		73.64						0.00	0.00

Fuente: SISPRO, 2020.

En los menores de 5 años las causas de mortalidad más frecuentes son las relacionadas con las afecciones originadas en el periodo perinatal, seguido de las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Se resalta que, aunque las afecciones originadas en el periodo perinatal son las causas de mortalidad más frecuente, para el año 2018, las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son la primera causa de mortalidad en este grupo de edad.

Número de Casos, Mortalidad Especifica por subgrupos

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

Tabla 27. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Diarrea Y Gastroenteritis De Presunto Origen Infeccioso	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras Enfermedades Virales	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	1	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0
Otras Enfermedades Infecciosas intestinales	Menores de 5 años	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Tos Ferina	Menores de 5 años	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
	Menores de 1 año	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Infección Meningococica	Menores de 5 años	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
	Menores de 1 año	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
Resto de ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias.	Menores de 5 años	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0
	Menores de 1 año	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0

Fuente: SISPRO, 2020.

Las enfermedades infecciosas y parasitarias son producto de microorganismos que ingresan al organismo venciendo la inmunidad del mismo, este tipo de enfermedades son producto de bacterias, protozoarios, virus y hongos. Este tipo de afectaciones tienen diferentes vías de ingreso como son respiratoria, mucosa y cutánea además se consideran una de las principales causas de mortalidad a nivel nacional. Las diarreas y gastroenteritis y otras enfermedades virales, son la principal causa de muerte en esta población, es de resaltar que este tipo de patologías se pueden prevenir desde el nivel comunitario.

Para el año 2018, no se registran mortalidad por esta causa

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

Tabla 28. Número de muertes en la infancia y niñez por neoplasias, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos													
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Leucemia (C91-C95)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de tumores (D00-D48)	Menores de 5 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO, 2020.

Las muertes por neoplasias en la infancia y niñez en el municipio de Algeciras se presentaron los años 2005 y 2013; lo cual evidencia la tendencia hacia el descenso en este grupo de enfermedades debido a que a partir del año 2014 no se han reportado muertes relacionadas con este subgrupo de causas.

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

Tabla 29. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Fuente: SISPRO, 2020.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Anemias (D50-D64)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D65-D89)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

En periodo en estudio no se reportaron muertes por este subgrupo de causas en la población infantil del municipio de Algeciras.

Subgrupo de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Tabla 30. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Municipio de Algeciras, 2005 – 2017

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40-E64)	Menores de 5 años	1	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E34, E65-E88)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO, 2020.

A partir del año 2005, no se reportan casos de muerte por este subgrupo de causas en la infancia y niñez del municipio de Algeciras.

Subgrupo de enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del oído y apófisis mastoides

Tabla 31. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del oído y apófisis mastoides, Municipio de Algeciras

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Meningitis (G00-G03)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema nervioso (G04-G98)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO, 2019.

En el periodo de estudio, no se reportan casos de muerte por este subgrupo de causas en la infancia y niñez del municipio de Algeciras.

Subgrupo de enfermedades del sistema respiratorio

Tabla 32. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Neumonía (J12-J18)	Menores de 5 años	0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	1	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras infecciones respiratorias agudas (J00-J11, J20-J22)	Menores de 5 años	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J30-J98)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO, 2020.

La principal causa de mortalidad en este subgrupo es la neumonía, la cual afecta a los tres grupos de edad en la infancia y niñez; el año 2018 no reporto muerte por esta causa.

Subgrupo de enfermedades del sistema digestivo

Tabla 33. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema digestivo, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

En la tabla anterior, se observa que las enfermedades del sistema digestivo se reportaron

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Enfermedades del Sistema Digestivo	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO, 2020

como causa de muerte en la infancia y niñez del municipio de Algeciras en los años 2009 y 2014; para el año 2015 a 2018 no se reportaron muertes por este subgrupo de causas.

Subgrupo de enfermedades originadas en el periodo perinatal

En este subgrupo, la causa que más aporta eventos es la dificultad respiratoria del recién nacido, la cual muestra una tendencia al descenso a partir del año 2014; en segundo lugar, se encuentran otras afecciones respiratorias del recién nacido, las cuales a partir del año 2009 no reportan casos. No obstante, para el año 2015 a 2018 no se reportan mortalidades por esta causa.

Es de agregar que la mortalidad por este subgrupo de causas no es excesiva, ni tiene un comportamiento epidemiológico importante ya que son eventos en la mayoría de los casos no evitables.

Tabla 34. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05-P08)	Menores de 5 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traumatismo del nacimiento (P10-P15)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (P20-P21)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dificultad respiratoria del recién nacido (P22)	Menores de 5 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neumonía congénita (P23)	Menores de 5 años	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras afecciones respiratorias del recién nacido (P24-P28)	Menores de 5 años	1	1	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	1	1	0,0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sepsis bacteriana del recién nacido (P36)	Menores de 5 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve (P38)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50-P61)	Menores de 5 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
Resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-P96)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO, 2020.

En la vigencia 2018 se reporta 1 defunción en menor de 1 años por evento de feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto.

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

Para el año 2018, dentro del subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, se presentó una defunción por malformaciones congénitas del corazón en el menor de 1 año, el anterior reporte se había realizado en el año 2009.

Tabla 35. Número de muertes en la infancia y niñez, por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Hidrocéfalo congénito y espina bífida (Q03, Q05)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, Q06-Q07)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malformaciones congénitas del corazón (Q20-Q24)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0	2	0,0	0,0	1
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	1	0,0	0,0	0,0	2	0,0	0,0	1
Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q25-Q28)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0
Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras malformaciones congénitas (Q30-Q89)	Menores de 5 años	1	0,0	0,0	1	0,0	2	0,0	0,0	1	2	1	0,0	2	0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	0,0	0,0	1	0,0	2	0,0	0,0	1	2	1	0,0	2	0,0

Fuente: SISPRO, 2020.

Subgrupo de hallazgos clínicos.

Para el año 2018, en el subgrupo de hallazgos clínicos no se reportan eventos.

Tabla 36. Número de muertes en la infancia y niñez, por hallazgos clínicos, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos 2005	Número de casos 2006	Número de casos 2007	Número de casos 2008	Número de casos 2009	Número de casos 2010	Número de casos 2011	Número de casos 2012	Número de casos 2013	Número de casos 2014	Número de casos 2015	Número de casos 2016	Número de casos 2017	Número de casos 2018
Síndrome de muerte súbita infantil (R95)	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0
	De 1 a 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R94, R96-R99)	Menores de 5 años	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: SISPRO, 2020.

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad

La causa más común de mortalidad en este subgrupo son los accidentes que obstruyen la respiración, los cuales aportaron un total de 5 casos entre los años 2005 a 2017; seguido del envenenamiento accidental y exposición a sustancias nocivas. Para el año 2018, no se registró ningún caso de muerte por relacionado con este subgrupo de causas.

Tabla 37. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018

Fuente: SISPRO, 2020.

Subgrupos de causas de muerte según lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 causas)	Grupos de edad	Número de casos													
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accidentes de transporte	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ahogamiento y Sumersión Accidentales	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Accidentes que Obstruyan la Respiración	Menores de 5 años	0,0	3	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	1	3	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Envenenamiento Accidental por Exposición y sustancias Nocivas	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Todas Las demás Causas Externas	Menores de 5 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Entre 1 y 4 años	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Menores de 1 año	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.4 Mortalidad relacionada con salud mental

Tabla 38 Mortalidad eventos relacionados con Salud Mental

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Trastornos del comportamiento																	1											
Epilepsia			1	1									1		1				1				1					

Fuente: SISPRO, 2020

El mayor número de defunciones se relacionan con epilepsia y con mayor presencia del género masculino con el 60% de las muertes.


Tabla 39 Síndrome Respiratorio Agudo Grave

Grupo Edad	MASCULINO	FEMENINO
De 0 a 04 años		
De 05 a 09 años		
De 10 a 14 años		
De 15 a 19 años		
De 20 a 24 años		
De 25 a 29 años		
De 30 a 34 años		
De 35 a 39 años		
De 40 a 44 años		
De 45 a 49 años		
De 50 a 54 años	1	
De 55 a 59 años		
De 60 a 64 años		
De 65 a 69 años	2	1
De 70 a 74 años	1	
De 75 a 79 años	1	
De 80 años o más	1	1
No Reportado		
TOTAL	6	2

Fuente SIVIGILA

A partir del archivo de SIVIGILA se obtuvo la anterior información acerca del síndrome respiratorio agudo, según el cual el 75% de los casos se reportan en población masculina y el 25% al femenino.


FIGURA 41 Eventos con síndrome respiratorio y condiciones agregadas



Fuente SIVIGILA

El 90% de los eventos fueron catalogados como sintomáticos respiratorios, por lo que presentaron tos, el 50% presentaron fiebre, presentaban EPOC, el 25% enfermedad cardiaca y el 25% diabetes.

FIGURA 42 Pirámide Poblacional



Fuente Segcovid

En la pirámide poblacional de la figura anterior no se evidencia la población fallecida por COVID 19 en el municipio, teniendo en cuenta que con respecto al dato consolidado del departamento los datos del Municipio solo corresponden al 1%.
Con respecto al género la población más afectada corresponde al femenino con el 57%, con respecto a la edad la mortalidad se concentra en la población mayor de 60 años.

Tabla 40 Mortalidad por COVID según ámbito.

MUNICIPIO	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito		DEPARTAMENTO	Ámbito de atención de la mortalidad	Total de muertes según ámbito de atención		Concentración de muertes según ámbito de atención - DPTO
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
MUNICIPIO	Consulta Externa	0		DEPARTAMENTO	Consulta Externa	0		#DIV/0!
	Cuidado Intensivo	0			Cuidado Intensivo	167	20	0.00
	Cuidado Intermedio	1	17		Cuidado Intermedio	15	2	0.07
	Domiciliaria	0			Domiciliaria	7	1	0.00
	Hospitalización	1	17		Hospitalización	93	11	0.01
	No Reportado	3	50		No Reportado	555	65	0.01
	Otro	0			Otro	0		#DIV/0!
	Urgencias	1	17		Urgencias	16	2	0.06
	Total	6	100		Total	853	100	0.01

Fuente Segcovid

Con respecto al ámbito el mayor peso porcentual tanto a nivel Municipal como departamental corresponde a no reportado.

Tabla 41 Mortalidad por COVID según comorbilidad

ALGECIRAS	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad Municipio		DEPARTAMENTO	Tipo de Comorbilidad	Total Comorbilidad DPTO		Concentración Municipio
		2020	Proporción			2020	Proporción	2020
ALGECIRAS	Artritis		0.00	DEPARTAMENTO	Artritis	5	0.32	0.00
	Asma	1	6.25		Asma	41	2.62	0.02
	Cáncer		0.00		Cáncer	16	1.02	0.00
	una)	5	31.25		una)	397	25.37	0.01
	Diabetes		0.00		Diabetes	147	9.39	0.00
	Enfermedades Huérfanas		0.00		Enfermedades Huérfanas	1	0.06	0.00
	EPOC	3	18.75		EPOC	103	6.58	0.03
	ERC		0.00		ERC	92	5.88	0.00
	Hipertensión	3	18.75		Hipertensión	286	18.27	0.01
	Sobrepeso y Obesidad		0.00		Sobrepeso y Obesidad	106	6.77	0.00
	Terapia Reemplazo Renal		0.00		Terapia Reemplazo Renal	27	1.73	0.00
	VIH		0.00		VIH		0.00	#DIV/0!
	Mayor de 59	4	25.00		Mayor de 59	344	21.98	0.01
	Total	16	100.00		Total	1565	100.00	0.01

Fuente Segcovid

Con respecto a la comorbilidad el mayor peso porcentual tanto a nivel Municipal como departamental corresponde al grupo de al menos 1 comorbilidad, seguida de la edad mayor de 59 años.

2.1.5 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez

Para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez se tuvo en cuenta los indicadores de razón de razones de mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, mortalidad por EDA, mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad en el período comprendido entre los años 2005 a 2018; para el Municipio de Algeciras se tomó como referencia el valor del indicador del departamento del Huila para el año 2018.

Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizará la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización.

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o departamento y el indicador nacional.

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el indicador nacional.

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el año 2017.

(↘) Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior.

(↗) Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior.

(-) Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior.

Tabla 42. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Algeciras, 2005- 2018

Causa de muerte	HUILA	ALGECIRAS	Comportamiento													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Razón de mortalidad materna	10.77	0.00
Tasa de mortalidad neonatal	6.78	2.79	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢
Tasa de mortalidad infantil	10.07	7.69	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢
Tasa de mortalidad en la niñez	12.70	8.38	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años	12.12	0.00	▢	▢	▢	▢	▢	▢	▢	.	.
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años	0.87	0.00	.	.	▢	▢
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años	2.60	0.00	▢


Fuente: SISPRO, 2020.

En la tabla de semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil, para el año 2018 no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre departamento y municipio, la tasa de mortalidad neonatal, infantil, y de la niñez, con tasa más baja que las departamentales.

Mortalidad materna

En el municipio de Algeciras se reportó evento en el año 2016 con una tasa de 324.68, presentando indicador muy superior al reportado por el departamento, a partir de esa fecha no se han reportado eventos.

Figura 43. Razón de mortalidad materna, Municipio de Algeciras, 2005 a 2018




Fuente: SISPRO, 2020.

Mortalidad neonatal

En el Municipio de Algeciras durante los años 2005 a 2018, reporto eventos con excepción del año 2011, durante los periodos comprendidos del 2007 al 2010 y 2014 a 2016 el indicador municipal supero el indicador departamental.

Figura 44 Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Algeciras 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020.

Mortalidad infantil

La mortalidad infantil a nivel del Municipio presenta un aumento en las tasas en los años 2009 y 2010, superando las estimaciones departamentales; en el año 2016 se registró una tasa de 6,49, tendencia a la disminución. En el año 2018, a pesar de presentar repunte en el indicador se mantiene por debajo del indicador departamental.

Figura 45.Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020.

Mortalidad en la niñez

La mortalidad en la niñez a nivel del Municipio de Algeciras presenta una tendencia hacia el descenso en comparación con las estimaciones departamentales; sin embargo, los años 2009, 2010 2014 y 2015 presentan tasas de mortalidad superiores a la estadística del departamento. En los años 2016, 2017 y 2018 la tasa de mortalidad en la niñez disminuyó considerablemente.

Figura 46. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020.

Mortalidad por enfermedad diarreica aguda – EDA

Durante los años 2005 a 2018 se presentó un evento de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en el Municipio, reportando una tasa de mortalidad de 35,78 en el año 2009 la cual se encuentra por encima de las estimaciones del departamento; en el año 2018 no se presentó mortalidad por enfermedad diarreica aguda – EDA.

Figura 47. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020.

Mortalidad por infecciones respiratorias agudas – IRA

Al observar el comportamiento de la mortalidad a causa de infecciones respiratorias agudas en el Municipio de Algeciras durante el periodo 2005 a 2017, se observa que el municipio de Algeciras presento tasas de mortalidad superiores a las estimaciones del departamento los años 2006, 2007, 2013 y 2014; y en el año 2016, en los demás años no se registraron casos.

Figura 48. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018




Fuente: SISPRO, 2020.

Mortalidad por desnutrición

En el periodo de estudio desde el año 2005 hasta el año 2018, el municipio de Algeciras registro una tasa de mortalidad por desnutrición en el año 2005, la cual se encuentra por encima de las estimaciones departamentales; no obstante, a partir del año 2006 hasta el año 2018, el municipio presenta tasas de mortalidad por desnutrición en 0,0.

Figura 49. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio de Algeciras, 2005 – 2018



Fuente: SISPRO, 2020

Determinantes estructurales

Etnia

Las etnias en Colombia se determinan como el conjunto de personas que comparten rasgos culturales, idioma, religión, celebración de ciertas festividades, expresiones artísticas como música, vestimenta, nexos históricos, tipo de alimentación entre otros; y muchas veces, un territorio.

En el departamento del Huila estos grupos se encuentran concentrados en áreas de gran densidad poblacional ocupando en su mayoría zonas subnormales de la región.

Mortalidad Materna por Etnia.


En la tabla de mortalidad materna por etnias se aprecia una tasa de 324.68 por 1.000 nacidos vivos en total es decir un caso mortalidad materna perteneciente a otras etnias, en el año 2016. Para el 2018 no se registró eventos de mortalidad.

Tabla 43. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia, Municipio de Algeciras 2005 – 2018

Etnia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - INDÍGENA										
5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE										
6 - OTRAS ETNIAS								325.73		
NO REPORTADO										
Total General								324.68		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2017

Figura 50 Tasa de Mortalidad Materna por Etnia, Municipio Algeciras 2009 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2018

Mortalidad Neonatal por Etnia.

En el periodo analizado en el municipio de Algeciras 2009 al 2018, se presentó mortalidad neonatal, con predominio en otras etnias.

Figura 51. Tasa de Mortalidad Neonatal por Etnia, Municipio de Algeciras 2009- 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Con relación a la mortalidad neonatal se observa que para el año 2018 se reportó una tasa de mortalidad neonatal de 2,80 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en otras etnias, presentando una leve disminución respecto al año anterior en el mismo grupo poblacional.

Mortalidad menor de 1 año según etnia

FIGURA 52 Mortalidad menor de 1 año según Etnia




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

En los años 2008, 2009, 2010 y 2011, se reportaron los mayores indicadores, siendo el correspondiente al año 2010 el mas alto de toda la vigencia con un importante comportamiento de descenso posterior.

Otros indicadores según etnia


FIGURA 53 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Los indicadores más altos se reportan en los años 2008 y 2009 con una tendencia a la reducción, para el año 2018 el indicador fue de 4,76 con reducción, con respecto al año anterior.

FIGURA 54 Otros indicadores según Etnia



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Área de Residencia

Mortalidad Materna


Se relaciona en el periodo analizado 2009 – 2018, un registro de mortalidad materna en el municipio de Algeciras en el área rural dispersa en el año 2016.

Tabla 44. Indicadores Razón de Mortalidad Materna por Área de Residencia, Municipio de Algeciras 2009 – 2018

Area Geográfica	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 - CABECERA										
2 - CENTRO POBLADO										
3 - AREA RURAL DISPERSA								806.45		
SIN INFORMACION										
Total General								324.68		

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Figura 55 Razón de Mortalidad Materna por Área de Residencia, Municipio de Algeciras 2005 – 2018



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Mortalidad Neonatal por Área de Residencia


Con relación a la mortalidad neonatal, se observa que la mayor incidencia de este evento se presentó en el año 2009 en la cabecera municipal, seguido del área rural dispersa con un pico máximo de 31,91 y 9,05 casos por cada 1.000 nacidos vivos respectivamente. Para el año 2016, a partir del año 2016 se evidencia una disminución gradual del indicador

Tabla 45. Indicadores Razón de Mortalidad Neonatal por Área de Residencia del Municipio de Algeciras 2009 – 2018

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
Rural	7.46	6.85	3.31	7.25	7.91	4.24	0.00	0.00	0.00	5.29	9.62	0.00	0.00	5.46	4.41
Urbana	4.39	7.75	21.05	19.70	31.91	11.36	0.00	7.04	12.50	10.70	16.76	6.33	6.25	0.00	11.27

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

Figura 56. Razón de Mortalidad Neonatal por Área de Residencia, Municipio de Algeciras 2009 – 2018




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

La mortalidad neonatal ha presentado un comportamiento fluctuante a través del periodo verificado con algunos picos en los años 2008 y 2015.

Con respecto al área de residencia la zona urbana presenta indicadores superiores a los reportados en la zona rural.

FIGURA 57 Tasa de Mortalidad Menor de 1 año según Area




FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2018

La mortalidad neonatal ha presentado un comportamiento fluctuante a través del periodo verificado con pico en el año 2009.

Con respecto al área de residencia la zona urbana presenta indicadores superiores a los reportados en la zona rural.

Otros indicadores según área

FIGURA 58 Porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

El evento de bajo peso al nacer ha presentado un comportamiento fluctuante a través del periodo verificado con algunos picos en los años 2011 y 2014.

Con respecto al área de residencia la zona rural presenta indicadores superiores a los reportados en la zona urbana.

Tabla 46 porcentaje de nacidos vivos con cuatro o mas consultas de control prenatal

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
Urbano	77.78	84.58	89.27	93.00	91.85	91.76	90.74	87.97	95.63	94.65	97.19	93.67	95.00	93.71	90.89
Rural	81.09	78.08	87.69	91.32	88.43	90.79	93.21	91.15	90.15	95.77	92.79	90.67	93.26	92.35	89.46

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

A partir del año 2008 el indicador se encuentra por encima del 90% en ambas zonas de residencia

Tabla 47 porcentaje de partos atendidos por personal calificado

PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total general
Urbano	92.48	94.57	94.21	92.12	95.21	96.59	99.41	96.48	98.13	97.86	97.21	100.00	99.38	98.29	96.30
Rural	77.15	89.04	87.04	86.91	88.93	88.89	92.67	92.54	96.08	95.24	97.60	96.00	97.77	96.72	90.78

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)

El indicador se encuentra por encima del 90% en ambas zonas de residencia.

2.1.6 Identificación De Prioridades Identificadas Por Mortalidad General, Especifica Y Materno – Infantil Y De La Niñez.

Se enlistaron las prioridades

identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad específica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.

Tabla 48. Identificación de prioridades en salud del Municipio de Algeciras, 2018

Mortalidad	Prioridad	Valor del indicador ALGECIRAS	Valor del indicador HUILA	Tendencia 2005 a 2017	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas*	1. Enfermedades del sistema circulatorio	175	188,97	Tendencia al aumento	001
	2.Las demás Causas	113.4	125.6	Tendencia al aumento	000
	3.Causas externas	63.1	62.3	Tendencia al aumento	012
	4. Neoplasias	54,3	100.1	Tendencia a la disminución	007
	5.Transmisibles	25.3	38.3	Tendencia al aumento	009
Específica por Subcausas o subgrupos	1.Enfermedad isquémica del corazón	90.7	107.1	Tendencia al aumento	001
	Homicidios	29.1	20.3	Tendencia al aumento	012
	3.Enfermedad Crónicas de las Vías Respiratorias	27.9	29.07	Se mantiene	000
	2.Tumor Maligno de cuello del útero	24	6.2	Tendencia al aumento	007
	2.Tumor Maligno de Estomago	23.7	20,37	Tendencia a la disminución	007

Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 grandes causas	1.Malformaciones congénitas	79.18	56.26	Se mantiene	008
Indicadores trazadores	2.Mortalidad neonatal	2.79	6.78	Tendencia a la disminución	008
	2.Mortalidad en la niñez	7.69	10.07	Tendencia al aumento	008
	3.Mortalidad infantil	8.38	12.70	Tendencia al aumento	008

Fuente: Base de Datos SISPRO 2020.

CONCLUSIONES

- Para el año 2018 la principal causa de mortalidad se relaciona con las enfermedades del sistema circulatorio que presento un incremento en 29 fallecimientos por cada 100000 hbts con respecto al año 2017, en su orden se registra la mortalidad por las demás causas con un crecimiento con respecto a la vigencia anterior en 21 fallecimientos por cada 100000 hbts,
- En la población tanto masculina como femenina la principal causa de muerte se relaciona con las enfermedades del sistema circulatorio.
- Con respecto a los años de vida potencialmente perdidos la causa que mas aporte realizo fue las demás causas con un 27% y un crecimiento del 44% con respecto al año 2017, seguido de la enfermedades del sistema circulatorio con el 23% y un crecimiento del 18%, las neoplasias aportaron el 12% y decrecieron en un 55%.
- En los hombres la principal causa de AVPP corresponde a las causas externa con un aporte de 43% y un crecimiento del 69%; seguido de las demás causas con un 22% y un crecimiento importante del 133%.
- En la población femenina la principal causa corresponde a enfermedades del sistema circulatorio con el 37% y un crecimiento del 78% con respecto al año anterior, seguido de las demás causas que aportaron el 35%
- En cuanto a la principal causa de mortalidad que corresponde a enfermedades del sistema circulatorio la subcausa de mayor presencia corresponde a tanto en hombres como mujeres las enfermedades isquémicas.

- Para el periodo 2017, en la población del municipio de Algeciras, los eventos que más se relacionan con los años de vida potencialmente perdidos son las neoplasias, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio, y las demás causas.
- Con relación a la mortalidad infantil, las malformaciones congénitas son la principal causa de muerte en este grupo poblacional en el año 2018 afectando en igual proporción a población femenina y masculina.
- En el periodo entre 2005 a 2018 en el municipio de Algeciras registro un caso de mortalidad materna, en el área rural.
- La tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil, tienden a disminuir. Se registra casos de mortalidad infantil por EDA en el 2009, por desnutrición en el año 2005 y por infecciones respiratorias agudas se registra mortalidad infantil en los años 2006, 2007, 2013, 2014 y 2016.

2.2 Análisis De Morbilidad

Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio.

2.2.1 Principales causas de morbilidad

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas.

Morbilidad Atendida

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el municipio de Algeciras, por ciclo vital y sexo, la fuente información a utilizar corresponde al link de la bodega de datos de SISPRO. Los datos analizados por categorías, se describen a continuación, en la tabla 42, principales causas de morbilidad.

Tabla 49. Principales causas de morbilidad, Municipio de Algeciras 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	57,51	54,66	54,38	52,45	51,79	48,16	48,86	44,37	49,05	40,87	38,97	-1,90
	Condiciones perinatales	1,43	0,79	2,41	2,04	2,59	4,30	2,77	2,80	2,30	4,33	5,37	1,04
	Enfermedades no transmisibles	26,82	23,63	24,56	24,36	25,05	28,54	28,13	27,19	27,26	32,63	30,62	-2,02
	Lesiones	3,00	3,47	4,50	4,72	4,89	4,42	5,02	5,45	5,16	5,54	4,73	-0,81
	Condiciones mal clasificadas	11,24	17,46	14,16	16,42	15,68	14,58	15,21	20,18	16,24	16,63	20,31	3,68
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	43,70	38,27	31,97	31,94	34,25	31,32	26,67	24,32	28,73	27,43	22,24	-5,19
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,12	0,00	0,04	0,03	-0,01
	Enfermedades no transmisibles	37,70	35,16	48,49	46,99	43,39	45,18	47,18	50,03	47,46	46,56	52,30	5,74
	Lesiones	6,81	6,53	5,35	4,68	5,35	6,56	7,01	5,91	6,51	6,89	6,59	-0,30
	Condiciones mal clasificadas	11,79	20,05	14,20	16,39	17,02	16,94	18,75	19,63	17,30	19,09	18,84	-0,25
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	29,86	25,90	19,32	20,05	20,10	18,20	17,03	14,69	16,03	13,56	13,01	-0,55
	Condiciones maternas	7,26	4,66	4,37	5,59	4,97	4,58	4,04	4,21	4,41	3,38	2,81	-0,57
	Enfermedades no transmisibles	42,89	43,73	51,62	51,75	44,82	52,54	52,49	51,60	52,57	53,55	59,24	5,70
	Lesiones	5,12	7,05	5,60	5,46	7,39	7,78	8,33	8,84	7,76	7,30	6,09	-1,21
	Condiciones mal clasificadas	14,87	18,66	19,09	17,15	22,72	16,90	18,10	20,66	19,23	22,21	18,85	-3,37
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	15,87	17,61	14,75	14,16	12,81	11,88	12,80	11,52	14,34	10,79	12,91	2,12
	Condiciones maternas	12,42	8,57	7,41	8,55	7,78	12,28	8,09	6,39	6,74	5,12	4,91	-0,20
	Enfermedades no transmisibles	55,99	51,58	56,65	55,44	44,71	56,73	54,19	55,89	54,68	57,44	56,80	-0,65
	Lesiones	4,27	6,74	5,17	4,42	5,15	5,51	6,56	7,19	7,19	7,65	7,05	-0,59
	Condiciones mal clasificadas	11,45	15,50	16,03	17,44	29,55	13,61	18,35	18,91	17,06	19,01	18,33	-0,68
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	14,65	13,72	11,08	10,47	10,17	8,53	8,74	9,71	9,24	8,68	8,34	-0,34
	Condiciones maternas	72,15	71,52	73,02	71,80	67,18	73,44	72,56	69,50	70,60	72,00	71,55	-0,45
	Enfermedades no transmisibles	4,35	4,06	4,14	3,94	3,99	4,94	5,25	5,05	5,11	4,68	5,39	0,71
	Lesiones	8,86	10,71	11,76	13,78	18,67	13,09	13,45	15,74	15,04	14,63	14,71	0,08
	Condiciones mal clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persona mayor (Mayores de 60)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,06	7,74	6,38	6,16	4,71	6,01	6,00	5,91	5,79	5,46	5,29	-0,17
	Condiciones maternas	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	84,66	84,87	84,39	83,39	83,75	84,25	84,21	79,38	82,71	83,45	82,26	-1,19
	Lesiones	2,85	2,06	2,43	2,75	2,40	2,71	2,51	2,87	2,54	2,71	3,37	0,66
	Condiciones mal clasificadas	5,40	5,33	6,77	7,70	9,14	7,02	7,29	11,83	8,96	8,38	9,08	0,70

Fuente: SISPRO, 2020

La tabla anterior nos enseña la morbilidad por ciclo vital, a continuación, se realiza el análisis de cada uno de los ciclos vitales:

Primera infancia: En la población del ciclo de la primera infancia la principal causa de consulta para el año 2019, son las condiciones transmisibles y nutricionales con un 38,97% de proporción, este grupo presento disminución en -1,90 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 y 2018. Seguido en proporción están las enfermedades no transmisibles con un 30,62%, presentando una disminución de -2,02 porcentual en relación al año 2018, en tercer lugar, se encuentran las condiciones mal clasificadas con un 20,31% el cual presenta un aumento porcentual de 3,68 en relación al año 2018.

Infancia: En el grupo de infancia la principal causa de consulta son las enfermedades no transmisibles con un 52,30 porcentual, presentado un aumento de 5,74 con respecto al año 2018 mostrando que este evento ha tenido un comportamiento fluctuante. Le sigue en proporción condiciones transmisibles y nutricionales con 22,24 % de proporción para el 2019, reflejando una disminución de -5,19 con relación al año 2018. En tercer lugar se presentan las condiciones mal clasificadas con un 18,84, presentado una leve disminución de -0,25 en relación año 2019 – 2018.

Adolescencia: En el grupo de la adolescencia la principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con un 59,24 % el cual presenta un aumento de 5,70 de cambio porcentual en proporción entre 2019 y 2018. Le sigue en porcentaje las Condiciones mal clasificadas con un 18,85 %, presentando una disminución de 3,37 en relación año 2019 - 2018. En tercer lugar encontramos, las Condiciones transmisibles y nutricionales con 13,01%, continua presentado disminución el cual es de -0,55 en relación al año 2019 - 2018

Juventud: La principal causa de consulta son las enfermedades no transmisibles con un 56,80 % para el año 2018, presentado una leve disminución de -0,65 comparativo entre 2019 a 2018. Le sigue en proporción Condiciones mal clasificadas con 18,33 %, para el año 2019 presentando una leve disminución de -0,68 comparativo año 2019 - 2018. Y en tercer

lugar, Condiciones transmisibles y nutricionales con 12,92%, mostrando un aumento del 2,12 comparativo con el año 2019 – 2018.

Adulterez: En la población del ciclo de la Adulterez para el municipio de Algeciras, la principal causa de consulta son las enfermedades no transmisibles con un 71,55 % para el año 2019 mostrando una disminución de -0,45 comparativo para el año 2019 – 2018. Continúa en el segundo lugar las condiciones mal clasificadas con un 14,71% para el 2019, mostrando un leve aumento de 0,08 de cambio porcentual comparativo año 2019 - 2018. Como tercera causa de consulta esta las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 8,34% de proporción para el año 2019 mostrando una disminución de -0,34 comparativo año 2019 – 2018.

Persona mayor: En el ciclo de la persona mayor, la principal causa de consulta son las enfermedades no transmisibles con un 82,26% para el año 2019, reflejando una disminución porcentual de -1,19 en relación año 2019 – 2018. Se continúa con condiciones mal clasificadas con 9,08 reflejando un aumento de 0,70 comparativo con el año 2019 – 2018; y en tercer se encuentra las condiciones transmisibles y nutricionales con el 5,29 mostrando una leve disminución de -0,17 comparativo con el año 2019 – 2018.

Conforme al análisis podemos ver que en los diferentes ciclos de vida de la población de Algeciras la primera causa de morbilidad son las enfermedades no trasmisibles a excepción del ciclo de vida de primera infancia cual es condiciones transmisibles nutricionales; se muestra una intercalación entre condiciones transmisible y nutricionales, y condiciones mal clasificadas.

Morbilidad atendida por grandes causas en hombres

Tabla 50. Principales causas de morbilidad en hombres, Municipio de Algeciras

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	57,14	53,03	52,53	52,68	52,02	47,24	50,27	45,26	48,56	40,94	39,89	-6,05
	Condiciones perinatales	1,27	0,83	2,19	1,52	2,88	5,23	3,15	2,49	2,07	2,40	4,03	1,84
	Enfermedades no transmisibles	26,02	23,35	26,20	24,57	24,10	28,15	27,24	26,48	29,15	33,49	31,72	-1,77
	Lesiones	4,09	4,00	4,81	5,67	6,15	5,39	4,42	6,18	5,22	5,97	4,70	-1,27
	Condiciones mal clasificadas	11,46	18,79	14,26	15,55	14,85	13,99	14,93	19,58	15,01	17,20	19,66	2,46
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	40,20	37,67	31,60	30,91	37,27	30,34	27,48	23,53	27,73	26,25	19,62	-6,64
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	37,37	36,45	47,56	47,07	39,76	43,05	48,46	49,46	48,20	47,32	53,45	6,12
	Lesiones	9,09	7,59	7,21	6,25	7,87	8,43	8,32	7,08	7,73	7,81	8,88	1,06
	Condiciones mal clasificadas	13,33	18,29	13,64	15,77	15,10	18,18	15,74	19,93	16,33	18,61	18,06	-0,55
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	39,17	32,66	21,17	25,52	25,97	24,49	16,04	17,28	19,03	18,74	13,88	-4,86
	Condiciones maternas	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	39,34	37,48	51,87	48,83	44,31	44,75	53,09	50,40	50,32	50,51	58,02	7,52
	Lesiones	8,84	11,72	9,30	9,44	10,90	13,33	13,84	14,31	11,44	11,81	10,55	-1,27
	Condiciones mal clasificadas	12,65	17,98	17,66	16,21	18,82	17,43	17,03	18,01	19,22	18,94	17,55	-1,39
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	21,94	20,40	18,50	19,80	18,17	19,21	17,78	14,96	20,91	13,64	16,01	2,37
	Condiciones maternas	0,99	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	52,57	46,21	54,12	52,52	50,38	54,27	49,54	50,83	50,57	56,20	54,82	-1,38
	Lesiones	12,06	17,42	13,32	11,77	15,03	12,99	16,67	17,46	12,82	15,97	14,88	-1,09
	Condiciones mal clasificadas	12,45	15,97	14,06	15,75	16,41	13,53	16,02	16,75	15,70	14,19	14,29	0,10
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	18,16	16,83	11,81	12,36	13,39	10,17	9,85	11,95	10,04	10,71	9,47	-1,24
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	62,65	62,93	68,48	64,89	61,59	65,76	65,80	61,22	65,19	66,17	67,36	1,19
	Lesiones	9,98	8,84	9,67	8,82	8,19	10,34	11,55	10,71	11,45	10,64	10,72	0,08
	Condiciones mal clasificadas	9,22	11,40	10,04	13,94	16,83	13,73	13,00	16,11	13,32	12,48	12,45	-0,03
Persona mayor (Mayores de 60 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	6,52	8,47	5,84	6,57	5,38	6,92	5,40	6,19	5,69	5,86	5,77	-0,08
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	82,43	82,09	82,83	79,85	80,05	82,26	81,47	76,33	81,27	80,22	81,68	1,41
	Lesiones	3,88	3,18	3,41	3,79	3,42	3,15	4,37	3,74	3,49	3,60	3,19	-0,41
	Condiciones mal clasificadas	7,17	6,26	7,93	9,79	11,15	7,67	8,76	13,75	9,55	10,32	9,35	-0,98

Fuente: SISPRO, 2020.

El siguiente análisis de la morbilidad atendida en la población masculina del Municipio de Algeciras se describe conforme a la agrupación por ciclo vital de la población.

Primera infancia: La primera causa de morbilidad es condiciones transmisibles y nutricionales con un 39,89%, reflejando una disminución de -1,05 comparativo con los años 2019 -2018; la segunda causa son las enfermedades no trasmisibles con 31,72 mostrando una disminución de -1,77 comparativo con el periodo 2019 - 2018; en tercer lugar muestra las condiciones mal clasificadas con un 19,66, reflejando un aumento de 2,46 realizando la comparación de los años 2019 - 2018. La principal causa de morbilidad muestra una disminución en los últimos tres años.

Infancia: Conforme a los datos presentados en este ciclo de vida la primera causa de morbilidad son las enfermedades no trasmisibles con un 53,45% reflejando un aumento del 6,12 comparativo con el periodo 2019 – 2018; la segunda causa de morbilidad son las condiciones trasmisibles y nutricionales con el 19,62%, mostrando una disminución de - 6,64 comparativo con el periodo 2019 – 2018; la tercera causa son las condiciones mal clasificadas con un 18,06% mostrando una leve disminución de -0,55 comparativo con el periodo 2019 – 2018, analizando las primera causa de morbilidad venia en los últimos tres periodos en disminución pero para el periodo de estudio mostro un aumento.

Adolescencia: conforme al análisis, la primera causa de morbilidad son Las enfermedades no transmisibles con el 58,02%, reflejando un aumento de 7,52 comparativo con el periodo 2019 – 2018; la segunda causa de morbilidad es condiciones mal clasificadas con un 17,55% reflejando una disminución de -1,39 comparativo del periodo 2019- 2018; la tercera causa son las condiciones transmisibles y nutricionales con el 13,88% mostrando una disminución de -4,86 comparando con el periodo 2019 – 2018.

Juventud: En este grupo poblacional, las enfermedades no transmisibles expresan la mayor causa de morbilidad con el 54,86%, reflejando una disminución de -1,38 comparativo con el periodo 2019 -2018; la segunda causa se ve reflejada en las condiciones transmisibles y nutricionales con el 16,01% mostrando un aumento de 2,37 comparado con el periodo 2019 -2018; y la tercera causa son las lesiones con el 14,88% mostrando una reducción de -1,09 realizando la comparación para el periodo 2019 -2018.

Adultez: Las enfermedades no transmisibles expresan la mayor causa de morbilidad en este grupo poblacional con el 67,36%, mostrando un aumento en 1,19 puntos porcentuales comparativo con el periodo 2019-2018, seguido de las condiciones mal clasificadas con 12,47%, reflejando una leve disminución de -0,03 comparando el periodo 2019 – 2018, y la tercera causa de morbilidad las lesiones con 10,72%., reflejando un leve aumento de 0,08 comparando el periodo 2019 - 2018.

Persona mayor: En este grupo poblacional, las enfermedades no transmisibles expresan la mayor causa de morbilidad con el 81,68%, reflejando un leve aumento de 1,47 realizando el comparativo para el periodo 2019 – 2018; seguido de las condiciones mal clasificadas con 9,35%, mostrando una leve disminución de -0,98 para el periodo 2019-2018; En tercer lugar se encuentran las condiciones transmisible y nutricionales con un 5,77%, reflejando una leve disminución de -0,08 haciendo el comparativo del periodo 2019 -2018.

Conforme al análisis de las cifras muestra que para los ciclos de vida de infancia, adolescencia, adultez y persona mayor la causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles; y para la primera infancia la principal causa son las condiciones transmisibles y nutricionales, comparando los periodos 2019 – 2018.

Morbilidad atendida por grandes causas en mujeres

Tabla 51. Principales causas de morbilidad en mujeres, Municipio de Algeciras 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	57,89	56,48	56,32	52,21	51,54	49,31	47,30	43,49	49,57	40,80	38,04	-2,76
	Condiciones perinatales	1,59	0,75	2,63	2,57	2,27	3,12	2,37	3,12	2,55	6,37	6,73	0,36
	Enfermedades no transmisibles	27,64	23,94	22,84	24,15	26,10	29,03	29,12	27,90	25,25	31,73	29,50	-2,23
	Lesiones	1,87	2,87	4,17	3,76	3,50	3,21	5,69	4,72	5,10	5,07	4,76	-0,31
	Condiciones mal clasificadas	11,02	15,96	14,05	17,30	16,60	15,33	15,52	20,78	17,54	16,03	20,96	4,93
Infancia (6 - 11 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	47,24	38,73	32,32	32,99	30,91	32,21	25,85	25,06	29,66	28,48	24,58	-3,90
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,22	0,00	0,08	0,06	-0,02
	Enfermedades no transmisibles	38,04	34,16	49,37	46,91	47,39	47,14	45,90	50,56	46,77	45,37	51,28	5,91
	Lesiones	4,50	5,71	3,58	3,09	2,57	4,85	5,69	4,81	5,36	6,06	4,55	-1,51
	Condiciones mal clasificadas	10,22	21,39	14,74	17,01	19,13	15,80	21,75	19,35	18,21	19,51	19,53	0,02
Adolescencia (12 - 18 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	25,00	21,63	18,10	16,56	16,45	14,69	17,63	13,11	14,49	10,90	12,43	1,53
	Condiciones maternas	11,05	7,50	7,26	9,16	8,06	7,13	6,49	6,77	6,68	5,12	4,68	-0,44
	Enfermedades no transmisibles	44,75	47,67	51,45	53,62	45,14	56,89	52,13	52,33	53,73	55,10	60,05	4,95
	Lesiones	3,17	4,10	3,15	2,91	5,21	4,68	4,99	5,50	5,86	4,98	3,13	-1,85
	Condiciones mal clasificadas	16,03	19,10	20,04	17,76	25,14	16,61	18,75	22,29	19,24	23,89	19,71	-4,18
Juventud (14 - 26 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,89	16,42	13,42	12,00	11,24	9,23	10,78	10,18	11,39	9,50	11,54	2,05
	Condiciones maternas	16,14	12,24	10,03	11,76	10,05	16,71	11,38	8,88	9,76	7,44	7,08	-0,36
	Enfermedades no transmisibles	57,11	53,88	57,54	56,55	43,06	57,61	56,09	58,00	56,51	58,01	57,67	-0,34
	Lesiones	1,74	2,16	2,29	1,61	2,26	2,81	2,45	3,19	4,66	3,87	3,60	-0,27
	Condiciones mal clasificadas	11,13	15,30	16,72	18,08	33,39	13,64	19,30	19,75	17,67	21,19	20,11	-1,08
Adultez (27 - 59 años)	Condiciones transmisibles y nutricionales	13,27	12,38	10,78	9,63	8,65	7,85	8,24	8,71	8,90	7,82	7,79	-0,03
	Condiciones maternas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	75,87	75,21	74,87	74,89	69,81	76,60	75,71	73,18	72,90	74,50	73,61	-0,88
	Lesiones	2,14	2,00	1,89	1,77	2,01	2,72	2,39	2,53	2,42	2,14	2,77	0,63
	Condiciones mal clasificadas	8,71	10,41	12,46	13,71	19,53	12,83	13,66	15,58	15,78	15,55	15,83	0,28
Persona mayor (Mayores de 60)	Condiciones transmisibles y nutricionales	7,48	7,26	6,74	5,87	4,22	5,33	6,42	5,70	5,87	5,16	4,87	-0,30
	Condiciones maternas	0,06	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Enfermedades no transmisibles	86,43	86,69	85,41	85,90	86,41	85,75	86,14	81,84	83,79	85,85	82,76	-3,08
	Lesiones	2,03	1,33	1,80	2,01	1,67	2,38	1,19	2,17	1,82	2,05	3,52	1,67
	Condiciones mal clasificadas	4,00	4,72	6,01	6,21	7,70	6,54	6,24	10,29	8,51	6,94	8,85	1,91

Fuente: SISPRO, 2020.

El análisis de la morbilidad atendida se describe de acuerdo con la agrupación por ciclo vital de la población.

Primera infancia: Las condiciones transmisibles y nutricionales expresan la mayor causa de morbilidad en este grupo poblacional con el 38,04%, reflejando una disminución de -2,76 realizando el comparativo para el periodo 2019 – 2018; seguido de las enfermedades no transmisibles con 29,50%, mostrando una disminución de -2,23 comparando el periodo 2019 con el 2018; en el tercer lugar se presenta las condiciones mal clasificadas con 20,96%, mostrando un aumento de 4,93 realizando el comparativo 2019 – 2018.

Infancia: En este grupo poblacional, las enfermedades no transmisibles expresan la mayor causa de morbilidad con el 51,28%, mostrando un aumento de 5,41 comparando el periodo 2019 – 2018; seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con 24,58%, reflejando una disminución de 3,90 comparando el periodo 2019 – 2018; y en tercer lugar muestra las condiciones mal clasificadas con 19,53%, mostrando una leve disminución de -0,02 comparando el periodo 2019 -2018.

Adolescencia: Las enfermedades no transmisibles expresan la mayor causa de morbilidad en este grupo poblacional con el 60,05%, mostrando un aumento en 4,95 realizando la comparación con el periodo 2019 -2018; seguido de las condiciones mal clasificadas con 19,71%, mostrando una disminución de -4,18 del periodo 2019 – 2018, y condiciones transmisibles y nutricionales con 12,43%, reflejando un aumento de 1,53 realizando el comparativo del periodo 2019 - 2018

Juventud: En este grupo poblacional, las enfermedades no transmisibles expresan la mayor causa de morbilidad con el 57,67%, mostrando una leve disminución de -0,34 realizando el comparativo con los periodos 2019 2018; seguido de las condiciones mal clasificadas con 20,11%, reflejando una leve disminución de -1,08 comparativo con los periodos 2019 -2018; y las condiciones transmisibles y nutricionales con 11,54%, mostrando un aumento de 2,05 conforme al comparativo para los periodos 2019 -2018.

Adulthood: Las enfermedades no transmisibles expresan la mayor causa de morbilidad en este grupo poblacional con el 73,61%, mostrando una leve disminución de -0,88, realizando

el comparativo para el periodo 2019 – 2028; seguido de las condiciones mal clasificadas con 15,83%, mostrando un leve aumento de 0,28 para el periodo comparativo de 2019 – 2018; y las condiciones transmisibles y nutricionales con 7,79%, reflejando una leve disminución de -0,03 comparando el periodo 2019 y 2018.

Persona mayor: En este grupo poblacional, las enfermedades no transmisibles expresan la mayor causa de morbilidad con el 82,76%, reflejando una disminución de -3,08; seguido de las condiciones mal clasificadas con 8.85%, mostrando un aumento de 1,91 comparativo con el periodo 2019 – 2018; y las condiciones transmisibles y nutricionales con 4,87%, mostrando un comparativo para los periodos 2019 y 2018.

Conforme al análisis, se muestra que, en la población femenina del municipio de Algeciras, para los grupos de infancia, adolescencia, juventud, adultez y personas mayores, la causa más frecuente son las enfermedades no transmisibles.

2.2.2 Morbilidad específica por subgrupo

Para realizar el análisis de la morbilidad específica por subgrupo, se utilizó la clasificación Internacional de Enfermedades en su décima versión (CIE 10), de acuerdo con la lista de códigos del estudio carga global de enfermedad y las modificaciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social; además se realizó la estimación de cambios en puntos porcentuales en la frecuencia de enfermedad durante el período comprendido entre los años 2009 a 2019.

Tabla 52 Morbilidad según subcausa y Genero 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49.34	47.45	46.23	43.89	38.55	41.69	53.16	46.01	41.75	36.88	47.55	10.67
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49.63	50.57	51.33	54.57	58.63	56.59	45.64	52.40	57.47	61.14	50.49	-10.65
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1.04	1.98	2.44	1.53	2.82	1.73	1.21	1.60	0.78	1.97	1.96	-0.02
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93.05	94.68	88.90	88.64	86.14	84.36	87.82	85.27	89.90	75.58	796.20	720.62
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6.95	5.32	11.10	11.36	13.86	15.64	12.18	14.73	10.10	24.42	268.35	243.94
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D65-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.46	0.39	0.39	1.11	1.13	1.25	1.31	1.60	1.30	1.36	1.40	0.03
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.55	0.41	0.74	0.63	0.48	0.67	0.70	0.87	0.89	0.87	0.91	0.03
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.03	2.51	2.43	2.94	2.88	2.90	1.93	2.83	3.31	3.80	2.98	-0.82
	Desordenes endocrinos (D65-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4.33	6.55	3.26	2.50	2.08	2.14	1.59	2.20	2.43	3.56	3.34	-0.22
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5.44	5.83	4.59	5.26	6.13	7.49	8.23	8.16	7.74	7.03	6.51	-0.52
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5.80	4.46	4.35	4.88	5.97	5.44	3.84	5.92	6.11	5.96	6.39	0.43
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	25.90	25.68	28.30	28.99	30.15	23.84	23.46	19.74	19.71	21.74	19.48	-2.26
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5.64	4.75	4.35	4.26	5.32	3.28	2.88	2.74	3.58	2.95	3.28	0.33
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8.13	8.18	6.72	6.71	6.21	6.62	5.68	6.99	7.30	7.38	7.79	0.41
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16.12	13.47	15.05	14.59	16.41	19.24	22.38	20.77	20.35	18.47	16.83	-1.64
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6.64	6.23	4.99	5.28	4.99	3.46	4.12	4.52	4.97	4.99	4.58	-0.41
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10.67	10.89	8.91	8.34	8.83	8.52	9.98	10.29	10.44	10.70	10.15	-0.55
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.48	0.36	0.67	0.36	1.40	0.56	0.57	0.38	0.59	0.43	0.53	0.09
Condiciones orales (K00-K14)	7.81	10.28	15.26	14.14	8.00	14.60	13.33	12.98	11.28	10.76	15.85	5.09	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7.29	7.51	9.82	9.42	10.22	12.40	8.06	14.75	13.78	14.11	10.36	-3.75
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.32	0.26	1.44	0.28	1.30	0.64	1.43	3.15	1.56	1.50	1.42	-0.09
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.81	0.09	0.00	0.28	0.24	0.08	0.00	0.07	0.10	0.29	0.20	-0.09
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	91.57	92.14	88.75	90.01	88.25	86.89	90.51	82.02	84.57	84.09	88.03	3.93
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Tabla 53. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Primera Infancia, total población Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49.34	47.45	46.23	43.89	38.55	41.69	53.16	46.01	41.75	36.88	47.55	10.67
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49.63	50.57	51.33	54.57	58.63	56.59	45.64	52.40	57.47	61.14	50.49	-10.65
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1.04	1.98	2.44	1.53	2.82	1.73	1.21	1.60	0.78	1.97	1.96	-0.02
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	93.05	94.68	88.90	88.64	86.14	84.36	87.82	85.27	89.90	75.58	74.79	-0.79
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	6.95	5.32	11.10	11.36	13.86	15.64	12.18	14.73	10.10	24.42	25.21	0.79
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.46	0.39	0.39	1.11	1.13	1.25	1.31	1.60	1.30	1.36	1.40	0.03
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.55	0.41	0.74	0.63	0.48	0.67	0.70	0.87	0.89	0.87	0.91	0.03
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.03	2.51	2.43	2.94	2.88	2.90	1.93	2.83	3.31	3.80	2.98	-0.82
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4.33	6.55	3.26	2.50	2.08	2.14	1.59	2.20	2.43	3.56	3.34	-0.22
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5.44	5.83	4.59	5.26	6.13	7.49	8.23	8.16	7.74	7.03	6.51	-0.52
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5.80	4.46	4.35	4.88	5.97	5.44	3.84	5.92	6.11	5.96	6.39	0.43
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	25.90	25.68	28.30	28.99	30.15	23.84	23.46	19.74	19.71	21.74	19.48	-2.26
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5.64	4.75	4.35	4.26	5.32	3.28	2.88	2.74	3.58	2.95	3.28	0.33
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8.13	8.18	6.72	6.71	6.21	6.62	5.68	6.99	7.30	7.38	7.79	0.41
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16.12	13.47	15.05	14.59	16.41	19.24	22.38	20.77	20.35	18.47	16.83	-1.64
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6.64	6.23	4.99	5.28	4.99	3.46	4.12	4.52	4.97	4.99	4.58	-0.41
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	10.67	10.89	8.91	8.34	8.83	8.52	9.98	10.29	10.44	10.70	10.15	-0.55
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.48	0.36	0.67	0.36	1.40	0.56	0.57	0.38	0.59	0.43	0.53	0.09
	Condiciones orales (K00-K14)	7.81	10.28	15.26	14.14	8.00	14.60	13.33	12.98	11.28	10.76	15.85	5.09
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7.29	7.51	9.82	9.42	10.22	12.40	8.06	14.75	13.78	14.11	10.36	-3.75
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.32	0.26	1.44	0.28	1.30	0.64	1.43	3.15	1.56	1.50	1.42	-0.09
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.81	0.09	0.00	0.28	0.24	0.08	0.00	0.07	0.10	0.29	0.20	-0.09
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	91.57	92.14	88.75	90.01	88.25	86.89	90.51	82.02	84.57	84.09	88.03	3.93
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 50.49% presentando una disminución de 10.6 con relación al periodo 2019-2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 47.5% presentando un aumento de 10.6 en relación al periodo 2019 - 2018.

Condiciones materno perinatales

En las condiciones materno perinatales para el año 2019 la causa de morbilidad de condiciones maternas represento el 74.7% y las perinatales el 25.2%.

Enfermedades no transmisibles

En el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardio-vasculares con 19.3% de frecuencia mostrando reducción del 2.2 con relación al periodo 2019 - 2018, la segunda causa de morbilidad son las enfermedades genito-urinarias con el 16.8% mostrando reducción de 1.6 con relación al periodo 2019 – 2018; La tercera causa son las condiciones orales con el 15.8% presentando un aumento del 5 con relación al periodo 2019 – 2018.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el periodo 2019, la principal causa de morbilidad son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 88% presentando un aumento de 3.9 comparativo para el periodo 2019 – 2018; Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 10.3% presentando una disminución de 3.7 comparativo para el periodo 2019 - 2018.

Tabla 54 Morbilidad por subcausa género masculino 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49.64	47.53	43.88	43.97	38.73	41.42	50.29	45.57	41.41	37.54	46.11	8.57
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49.64	51.34	53.99	54.87	60.05	57.26	49.18	52.99	57.92	60.71	51.58	-9.13
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0.73	1.12	2.13	1.16	1.23	1.32	0.53	1.45	0.67	1.75	2.31	0.56
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	26.32	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	73.68	100.00	100.00	93.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D65-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.63	0.50	0.45	0.95	0.91	1.54	1.94	1.97	1.47	1.54	2.05	0.51
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.43	0.29	0.26	0.39	0.25	0.39	0.84	0.77	0.77	0.59	0.55	-0.04
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.10	2.70	2.78	3.23	2.67	2.36	1.45	2.43	3.08	2.89	2.50	-0.39
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3.81	5.43	2.70	1.99	1.50	1.39	1.08	1.57	1.34	2.12	1.61	-0.51
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6.58	7.94	6.35	7.30	7.74	8.14	10.48	10.68	9.80	8.93	7.10	-1.83
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7.85	6.50	5.77	6.02	7.69	7.28	5.16	7.07	7.10	7.00	6.54	-0.46
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	23.51	22.85	24.72	25.25	26.44	23.69	21.90	18.70	19.29	20.92	18.38	-2.54
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7.68	6.15	5.26	5.65	9.18	5.01	4.26	3.60	4.47	3.89	4.17	0.28
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	7.28	7.45	6.78	7.12	6.18	6.80	5.76	6.67	7.03	7.65	7.08	-0.56
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	7.18	8.15	9.08	9.14	10.13	11.92	14.94	12.40	14.61	14.25	17.73	3.48
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9.19	8.11	6.54	6.82	6.43	4.75	5.73	6.37	6.16	6.28	5.12	-1.17
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14.09	12.11	10.44	9.82	10.68	10.00	10.72	12.18	11.44	11.60	9.30	-2.29
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.57	0.49	1.30	0.39	1.36	0.82	0.78	0.57	0.84	0.64	0.66	0.01
Condiciones orales (K00-K14)	9.08	11.32	17.57	15.94	8.85	15.90	14.96	15.03	12.62	11.70	17.21	5.51	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7.27	5.08	7.88	8.61	8.67	12.38	6.61	16.76	12.38	13.63	12.21	-1.42
	Lesiones intencionales (X80-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.13	1.88	0.11	0.09	0.07	1.58	0.94	0.66	0.55	0.65	0.09
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.50	0.00	0.00	0.43	0.37	0.13	0.00	0.12	0.00	0.48	0.26	-0.22
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92.23	94.78	90.25	90.86	90.87	87.42	91.81	82.18	86.96	85.34	86.89	1.55
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 55.5% presentando una disminución de 9 con relación al periodo 2019-2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 46.1% presentando un aumento de 8.5 en relación al periodo 2019 - 2018.

Condiciones materno perinatales

En las condiciones materno perinatales para el año 2019 la causa de morbilidad de perinatal represento el 100%.

Enfermedades no transmisibles

En el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardio-vasculares con 18.3% de frecuencia mostrando reducción del 2.5 con relación al periodo 2019 - 2018, la segunda causa de morbilidad son las enfermedades genito-urinarias con el 17.7% mostrando incremento de 5.5 con relación al periodo 2019 - 2018; La tercera causa son las condiciones orales con el 17.2% presentando un aumento del 5.5 con relación al periodo 2019 - 2018.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el periodo 2019, la principal causa de morbilidad son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 86.8% presentando un aumento de 1.5 comparativo para el periodo 2019 - 2018; Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 12.2% presentando una disminución de 1.4 comparativo para el periodo 2019 - 2018.

Tabla 55 Morbilidad por subcausa genero femenino 2019

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	49.11	47.39	47.89	43.84	38.39	41.92	55.39	46.36	42.00	36.35	48.68	12.33
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	49.62	49.95	49.46	54.32	57.32	55.98	42.87	51.92	57.12	61.49	49.64	-11.85
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1.27	2.66	2.65	1.85	4.29	2.09	1.74	1.72	0.88	2.15	1.68	-0.47
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	95.74	97.53	93.64	91.85	92.50	93.16	94.50	91.13	94.32	81.16	82.55	1.38
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	4.26	2.47	6.36	8.15	7.50	6.84	5.50	8.87	5.68	18.84	17.45	-1.38
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.37	0.34	0.36	1.20	1.25	1.10	0.97	1.41	1.21	1.27	0.99	-0.28
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.60	0.47	0.98	0.76	0.61	0.81	0.63	0.93	0.95	1.03	1.13	0.10
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.00	2.42	2.25	2.78	3.00	3.18	2.19	3.05	3.43	4.29	3.27	-1.01
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto E65-E88)	4.59	7.10	3.54	2.77	2.40	2.52	1.86	2.53	3.02	4.33	4.41	0.08
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4.88	4.81	3.69	4.17	5.26	7.15	7.03	6.82	6.64	6.01	6.15	0.14
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4.80	3.46	3.63	4.28	5.03	4.50	3.14	5.31	5.58	5.40	6.30	0.90
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	27.06	27.07	30.13	30.98	32.17	23.92	24.30	20.29	19.93	22.19	20.16	-2.03
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4.65	4.07	3.89	3.53	3.22	2.39	2.14	2.28	3.10	2.45	2.73	0.28
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	8.54	8.53	6.69	6.50	6.23	6.52	5.63	7.16	7.45	7.23	8.23	1.00
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	20.47	16.06	18.09	17.47	19.82	22.98	26.38	25.23	23.44	20.74	16.26	-4.48
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5.40	5.31	4.20	4.47	4.21	2.80	3.26	3.53	4.33	4.29	4.25	-0.05
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9.01	10.29	8.12	7.56	7.83	7.77	9.59	9.29	9.90	10.21	10.68	0.47
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.44	0.29	0.35	0.35	1.41	0.43	0.45	0.28	0.46	0.32	0.45	0.12
	Condiciones orales (K00-K14)	7.19	9.78	14.09	13.18	7.54	13.94	12.45	11.89	10.56	10.25	15.00	4.75
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7.34	12.13	13.25	11.02	12.97	12.41	10.84	11.37	15.76	14.88	7.47	-7.41
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.92	0.50	0.66	0.62	3.45	1.51	1.14	6.86	2.82	3.00	2.62	-0.38
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1.38	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.10	0.10
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90.37	87.13	86.09	88.36	83.58	86.07	88.02	81.76	81.18	82.13	89.81	7.68
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 49.6% presentando una disminución de 11.8 con relación al periodo 2019-2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 48.6% presentando un aumento de 12.3 en relación al periodo 2019 - 2018.

Condiciones materno perinatales

En las condiciones materno perinatales para el año 2019 la causa de morbilidad de condiciones maternas represento el 82.5% y las perinatales el 17.4%.

Enfermedades no transmisibles

En el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardio-vasculares con 20.1% de frecuencia mostrando reducción del 2 con relación al periodo 2019 - 2018, la segunda causa de morbilidad son las enfermedades genito-urinarias con el 16.2% mostrando reducción de 4.4 con relación al periodo 2019 – 2018; La tercera causa son las condiciones orales con el 15% presentando un aumento del 7.6 con relación al periodo 2019 – 2018.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el periodo 2019, la principal causa de morbilidad son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 89.8% presentando un aumento de 7.6 comparativo para el periodo 2019 – 2018; Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7.4% .

Morbilidad por subgrupo y curso de vida

Morbilidad por subgrupo de la Primera infancia en la población total

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 68,07% presentando una disminución de -5,80 con relación al periodo 2019-2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 27,70% presentando un aumento de 5,43 en relación al periodo 2019 - 2018.

Condiciones materno perinatales

En las condiciones materno perinatales para el año 2019 la causa de morbilidad, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con el 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 29,97% de frecuencia mostrando un aumento del 3,61 con relación al periodo 2019 - 2018, la segunda causa de morbilidad son las enfermedades de la piel con el 21,83% mostrando un aumento de 0,69 con relación al periodo 2019 – 2018; La tercera causa son las enfermedades digestivas con el 9,91% presentando un aumento del 4,36 con relación al periodo 2019 – 2018.

Lesiones

Las lesiones como causa de morbilidad se agrupan en lesiones no intencionales, lesiones intencionales, lesiones de intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas. Para la población total de la primera infancia, durante el periodo 2019, la principal causa de morbilidad son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 87,50% presentando un aumento de 2,19 comparativo para el periodo 2019 – 2018; Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 12,50% presentando una disminución de - 2.19 comparativo para el periodo 2019 - 2018.

Tabla 56. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Primera Infancia, población Masculina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00- B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20- G03-G04, N70-N73)		41,24	40,99	37,59	34,52	29,36	23,88	31,03	28,19	28,33	22,57	27,14	4,58	
	J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50- D53, D64.9, E51-E64)	57,80	57,02	58,40	64,52	68,48	75,21	68,31	70,57	70,88	73,19	66,58	-6,61	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50- D53, D64.9, E51-E64))	0,96	1,99	3,02	0,96	1,16	0,91	0,67	1,24	0,78	4,24	6,27	2,03	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00- P96)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00- Neoplasias malignas (C00-C97)	D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03- E07, E10-E16, E20-E34,	0,00	0,00	0,23	0,41	1,61	1,65	1,97	0,91	1,12	0,00	0,48	0,48	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,35	0,00	0,70	0,00	0,18	0,35	0,25	0,91	0,19	0,15	0,16	0,01	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15	
	E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68- H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75- N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Desordenes endocrinos (D65-D64 excepto D64.9, D65- D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,05	1,19	1,40	2,06	2,32	1,18	0,98	1,82	0,56	0,76	2,09	1,33
	Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-G98)	3,15	3,57	3,72	2,89	5,00	4,94	7,13	8,48	9,51	9,60	3,38	-6,22	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	12,94	6,43	11,40	10,10	13,75	10,22	7,62	14,24	11,19	10,82	8,53	-2,29	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,75	0,00	0,00	0,82	0,36	5,29	0,49	0,30	0,37	0,91	1,77	0,86	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	22,38	16,67	23,49	18,76	17,86	11,16	13,02	10,00	7,28	7,62	6,92	-0,70	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,50	11,67	9,53	4,95	6,96	3,88	7,37	3,94	9,14	6,40	9,82	3,42	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,59	7,86	8,37	13,20	12,68	7,17	8,85	4,24	5,04	7,47	5,31	-2,16	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	29,37	23,81	14,19	25,57	14,64	11,05	14,00	19,70	18,66	20,73	19,97	-0,76	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	1,05	1,19	3,26	4,33	6,25	5,17	4,18	3,64	3,92	4,42	4,83	0,41	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	3,15	2,86	16,28	4,74	4,46	5,52	5,16	5,45	8,58	5,03	6,12	1,09	
	Condiciones orales (K00-K14)	15,73	24,76	7,44	12,16	13,93	32,43	28,99	26,36	24,44	25,91	30,60	4,68	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,67	13,89	13,92	9,82	6,29	31,90	16,67	11,69	16,67	17,95	16,30	-1,64	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93,33	86,11	86,08	90,18	93,71	68,10	83,33	88,31	83,33	82,05	83,70	1,64	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la primera infancia las infecciones respiratorias con 66,58% presentando una disminución de -6,61 con relación al periodo 2019 - 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 27,14% con un aumento de 4,58 comparativo para el periodo 2019 - 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad son las condiciones orales con 30,60% de frecuencia con un aumento de 4,68 puntos comparativo para el periodo 2019 - 2018, la segunda causa son las enfermedades de la piel con el 19,97% presentado una leve disminución de -0,76 comparativo para el periodo 2019 - 2018; La tercera causa son las enfermedades digestivas con el 9,82% presentando un aumento de 3,42 comparativo para el periodo 2019 - 2018.

Lesiones

Para la población masculina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 83,70% con tendencia a disminuir en -1,64, comparativo para el periodo 2019 - 2018. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con el 16,30% presentando una disminución de -1,64 comparativo para el periodo 2019 - 2018.

Tabla 57. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Primera Infancia, población Femenina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	40,00	34,44	40,89	33,83	26,15	27,70	36,88	32,54	31,19	21,96	28,30	6,34
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	59,19	62,36	55,13	63,51	70,55	70,10	62,34	65,44	67,29	74,80	69,66	-4,94
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,81	3,20	3,99	2,66	3,30	2,20	0,78	2,02	1,52	3,44	2,04	-1,40
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	5,88	0,00	0,00	0,00	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	94,12	100,00	100,00	100,00	97,92	97,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D65-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H83, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,84	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,92	0,17	0,18	0,01
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,52	0,00	0,00	0,18	0,14	1,02	0,29	0,46	0,34	0,18	-0,16
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,28	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	4,73	1,30	1,97	2,35	2,17	1,15	1,27	1,72	2,06	2,38	1,58	-0,80
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1,69	2,08	1,12	0,85	1,99	3,87	3,81	5,73	3,44	4,76	2,46	-2,31
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,46	9,90	12,08	10,66	11,59	7,32	7,87	8,88	12,84	9,35	8,42	-0,93
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,34	0,78	0,00	1,07	1,09	0,29	0,51	2,29	0,00	2,04	1,05	-0,99
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	12,84	17,19	19,66	16,84	8,70	5,45	7,11	6,59	7,80	6,80	5,09	-1,72
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5,07	8,59	7,30	5,33	4,53	8,03	5,08	6,02	6,42	4,59	10,00	5,41
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16,22	10,42	17,98	19,83	23,91	14,06	10,91	11,46	8,03	10,88	8,25	-2,64
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	27,36	17,19	25,56	22,17	19,38	16,64	22,08	15,19	21,10	21,60	23,86	2,26
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	4,39	1,82	1,97	3,20	2,17	4,02	5,33	4,58	5,96	6,12	4,39	-1,74
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	5,74	2,86	4,78	5,54	5,80	3,73	6,60	4,87	5,05	4,08	5,26	1,18
	Condiciones orales (K00-K14)	12,16	27,34	6,46	12,15	17,39	35,29	28,43	32,38	25,92	26,87	29,30	2,43
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	20,00	28,26	9,23	12,33	9,46	20,78	12,99	6,78	20,45	10,64	8,70	-1,94
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	80,00	71,74	90,77	87,67	90,54	79,22	87,01	93,22	79,55	89,36	91,30	1,94
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población de las niñas las infecciones respiratorias con el 69,66% presentando una disminución de -4,94 comparativo para el periodo 2019 - 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 16,30% mostrando un aumento de 6,34 comparativo para el periodo 2019 -2018.

Condiciones materno perinatales

La causa de morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la primera infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina son las condiciones orales con 29,30% mostrando un aumento de 2,43 comparativo con el periodo 2019 - 2018, la segunda causa son las enfermedades de la piel con 23,86% presentando un aumento de 2,26 comparativo con el periodo 2019 - 2018. La tercera causa son las enfermedades digestivas con el 10,00% mostrando un aumento de 5,41 comparativo con los años 2019 -2018.

Lesiones

Para la población femenina de la primera infancia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 91,30% mostrando un aumento de 1,94 comparativo para el periodo 2019 -2018. En segundo lugar, se encuentran las lesiones no intencionales con un 8,70% mostrando una disminución de 1-94 comparativo con el periodo 2019 -2018.

Tabla 58. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Infancia, total población. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	53,26	50,54	43,75	45,39	31,49	38,66	54,70	43,10	35,18	31,32	43,74	12,43	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	46,74	46,85	52,36	50,92	64,21	59,78	44,23	55,71	64,43	65,81	52,44	-13,37	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0,00	2,61	3,89	3,69	4,31	1,56	1,07	1,19	0,40	2,87	3,82	0,95	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#DIV/0!	85,71	50,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00						
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DIV/0!	14,29	50,00	#DIV/0!	100,00	100,00	0,00						
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,17	0,00	0,33	0,19	0,00	3,99	2,55	1,75	6,95	0,34	-6,62	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,27	0,17	0,00	0,08	0,19	0,64	0,24	0,35	0,16	0,18	0,39	0,21	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,27	0,00	0,00	0,17	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,54	0,00	1,56	1,25	1,84	1,40	1,33	1,74	1,75	1,25	1,57	0,32	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,82	6,19	2,45	3,85	3,69	5,28	3,74	7,06	11,00	9,63	9,19	-0,44	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	8,63	8,70	6,24	9,03	11,17	10,69	7,97	9,72	13,08	11,68	9,19	-2,49	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,50	0,00	0,25	0,00	0,83	0,60	0,58	0,24	0,36	0,45	0,09	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	16,44	9,03	7,46	8,78	11,85	6,43	11,11	5,67	7,26	5,53	6,11	0,58	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,58	6,52	3,56	3,51	5,63	4,65	3,02	5,56	4,23	4,19	4,76	0,57	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	8,89	7,36	4,90	8,28	14,56	9,87	8,57	7,41	4,47	6,60	4,48	-2,11	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	17,25	13,71	6,12	10,95	11,94	4,96	7,61	6,60	8,13	9,63	8,12	-1,50	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,77	4,18	2,45	2,84	3,59	4,01	4,83	3,82	3,91	6,33	4,48	-1,85	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,81	0,84	0,45	0,17	1,26	1,53	2,90	0,69	1,91	1,78	1,57	-0,21	
Condiciones orales (K00-K14)	30,73	42,64	64,81	50,50	34,27	49,59	44,08	48,26	42,11	35,92	49,36	13,44		
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	14,93	6,31	11,11	18,49	17,32	13,16	12,20	11,76	18,60	13,25	9,33	-3,92	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,44	-1,36	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	85,07	93,69	88,89	81,51	82,68	86,84	87,80	87,25	81,40	84,94	90,22	5,28	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las infecciones respiratorias con 52,44% presentando una disminución de -13,37 comparativo con el periodo 2019 – 2018; le sigue las enfermedades infecciosas y parasitarias con 43,74% reflejando un aumento de 12, 43 para el periodo comparado 2019 -2018.

Condiciones materno perinatales

La causa de la morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con el 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la Infancia para el periodo 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 49,36% reflejando un aumento de 13,44 comparativo para el periodo 2019 -2018; posteriormente se encuentran las condiciones neuropsiquiaticas con el 9,19 mostrando una disminución de -0,44 comparativo con el periodo 2019-2018 y las enfermedades de los órganos de los sentidos con 9,19 mostrando un disminución de -2,49 comparado con el periodo 2019 2018.

Lesiones

Para la población total de la Infancia, durante el periodo 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 90,22% presentando un aumento de 5,28 comparativo para el periodo 2019 -2018; la siguiente causa son las lesiones no intencionales con 9,33% reflejando una disminución de -3,92 comparado con el periodo 2019 -2018.

Tabla 59. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Infancia, población Masculina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	59,30	51,08	41,05	43,18	28,66	36,11	53,11	40,82	30,99	35,45	43,67	8,22
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	40,70	47,84	56,84	53,28	68,32	62,90	46,47	57,65	68,73	63,88	55,38	-8,50
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	1,08	2,11	3,54	3,02	0,99	0,41	1,53	0,28	0,67	0,95	0,28
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!	#/DNI!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E85-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,37	0,00	0,17	0,20	0,00	7,29	5,10	2,92	0,37	0,58	0,21
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,54	0,00	0,00	0,17	0,40	0,28	0,24	0,73	0,00	0,19	0,12	-0,07
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,54	0,00	0,00	0,33	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	0,54	0,00	1,86	1,16	1,41	1,26	1,65	1,70	1,78	1,11	1,63	0,51
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	10,81	6,69	2,80	3,15	4,85	7,13	3,76	5,58	11,67	11,69	8,48	-3,21
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6,49	8,92	6,29	8,62	10,10	12,03	8,71	12,62	12,16	13,36	9,41	-3,95
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,37	0,00	0,33	0,00	1,26	0,24	0,73	0,32	0,37	0,23	-0,14
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	16,22	11,15	7,69	11,28	15,15	8,81	12,71	5,58	8,27	5,57	6,62	1,05
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,86	4,46	3,03	2,82	4,65	3,08	1,65	5,10	4,54	3,90	3,25	-0,64
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	5,95	5,95	3,26	6,14	11,72	5,73	4,24	2,18	2,27	4,08	4,30	0,22
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	18,38	16,73	6,29	9,95	13,94	4,34	7,06	6,07	7,94	10,95	8,59	-2,35
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	4,32	4,09	3,50	2,82	2,42	3,22	4,94	3,40	4,05	7,61	3,60	-4,01
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0,54	1,49	0,47	0,17	1,01	2,38	3,76	1,21	1,62	2,78	2,21	-0,58
Condiciones orales (K00-K14)	30,81	39,78	64,80	52,90	34,14	50,35	43,76	50,00	42,46	38,03	50,99	12,95	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	15,58	3,57	10,77	16,25	17,35	12,14	10,96	13,56	17,17	11,24	8,39	-2,84
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-2,25
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	84,44	96,43	89,23	83,75	82,65	87,86	89,04	84,75	82,83	86,52	91,61	5,09
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina de la infancia, las infecciones respiratorias con 55,38% reflejando una disminución de -8,50 comparativo con el periodo 2019 -2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 43,67% mostrando un aumento de 8,22 comparando 2019 – 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019 no se reportan eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la Infancia en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los niños en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones orales con 50,99% mostrando un aumento del 12,95 comparado con el periodo 2019 -2018; la segunda causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos en 9,41% reflejando una disminución -3,95 comparando el periodo 2019 -2018. La tercera causa son las enfermedades de la piel con el 8,59% presentando una disminución de -2,35 realizando la comparación con el periodo 2019 – 2018.

Lesiones

Para la población masculina de la infancia, durante el periodo 2019, la principal causa de morbilidad son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,61% mostrando un aumento de 5,09 comparando el periodo 2019 – 2018; seguido las lesiones no intencionales con 8,39% presentando una disminución de -2,84 comparado con el periodo 2019 – 2018..

Tabla 60. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Infancia, población Femenina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H85-H86, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	48,05	50,13	46,25	47,48	35,24	40,85	56,39	45,09	38,86	27,90	43,79	15,89
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H85-H86)	51,95	46,11	48,21	48,68	58,74	57,09	41,85	54,02	60,64	67,40	50,34	-17,06
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0,00	3,75	5,54	3,84	6,02	2,05	1,76	0,89	0,50	4,70	5,87	1,17
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#/DIV/!	#/DIV/!	#/DIV/!	#/DIV/!	#/DIV/!	#/DIV/!	85,71	50,00	#/DIV/!	0,00	0,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#/DIV/!	#/DIV/!	#/DIV/!	#/DIV/!	#/DIV/!	#/DIV/!	14,29	50,00	#/DIV/!	100,00	100,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,00	0,00	0,00	0,51	0,19	0,00	0,50	0,22	0,63	13,04	0,11	-12,93
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,93	0,25	0,00	0,31	0,17	0,65	0,48
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto E65-E88)	0,54	0,00	1,28	1,35	2,24	1,52	0,99	1,77	1,73	1,37	1,52	0,14
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	4,84	5,78	2,13	4,55	2,62	3,74	3,72	8,41	10,36	7,72	9,85	2,13
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	10,75	8,51	6,18	9,44	12,15	9,58	7,20	7,08	13,97	10,12	8,98	-1,14
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,00	0,61	0,00	0,17	0,00	0,47	0,99	0,44	0,16	0,34	0,65	0,31
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	16,67	7,29	7,25	6,24	8,41	4,44	9,43	5,75	6,28	5,49	5,63	0,14
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4,30	8,21	4,05	4,22	6,54	5,96	4,47	5,97	3,92	4,46	6,17	1,71
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	11,83	8,51	6,40	10,46	17,20	13,32	13,15	12,17	6,59	8,92	4,65	-4,27
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	16,13	11,25	5,97	11,97	10,09	5,49	8,19	7,08	8,32	8,40	7,68	-0,72
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	3,23	4,26	1,49	2,87	4,67	4,67	4,71	4,20	3,77	5,15	5,30	0,16
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,08	0,30	0,43	0,17	1,50	0,82	1,99	0,22	2,20	0,86	0,97	0,12
Condiciones orales (K00-K14)	30,65	44,98	64,82	48,06	34,39	48,95	44,42	46,68	41,76	33,96	47,84	13,87	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	13,64	9,09	11,76	23,08	17,24	14,77	14,00	9,30	20,55	15,58	10,98	-4,61
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,22	-0,08
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	86,36	90,91	88,24	76,92	82,76	85,23	86,00	90,70	79,45	83,12	87,80	4,69
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, la primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las infecciones respiratorias con 50,34% presentado una disminución de -17,06 comparando con el periodo 2019 -2018; seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias con 43,79% presentando un aumento de 15,89 comparando el periodo 2019 -2018.

Condiciones materno perinatales

La causa de morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con el 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la Infancia para el periodo 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las niñas fueron las condiciones orales con 47,84% mostrando un aumento de 13,87 comparando el periodo 2019 -2018; la segunda causa son las condiciones neuropsiquiaticas con el 9,85% presentando un aumento de 2,13 comparado con el periodo 2019 – 2018; La tercera causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 8,98% presentando una disminución de -1,14 comparado con el periodo 2019 -2018.

Lesiones

Para la población femenina de la infancia, durante el periodo 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 87,80% presentando un aumento de 4,69 comparado con el periodo 2019 – 2018; seguida de la causa lesiones no intencionales con 10,98% mostrando una disminución de -4,61 comparando el periodo 2019 – 2018.

Tabla 61. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Adolescencia, total población. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	55,18	52,88	53,39	53,13	44,27	56,21	65,88	53,53	41,55	38,37	57,54	19,17	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	43,43	46,16	44,49	45,57	53,80	42,24	33,81	45,02	57,77	61,63	41,43	-20,20	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1,39	0,96	2,11	1,30	1,93	1,55	0,31	1,45	0,67	0,00	1,02	1,02	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	97,33	100,00	96,26	99,08	95,45	99,34	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	2,67	0,00	3,74	0,92	4,55	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,97	0,00	0,34	0,20	0,61	0,17	0,26	0,12	0,41	0,21	0,31	0,09	
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,14	0,06	0,25	0,25	0,42	0,77	0,47	1,02	1,29	0,48	-0,81	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,11	0,10	0,10	0,25	0,00	0,00	0,16	0,21	0,90	0,68	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,39	2,70	1,24	0,76	3,82	1,87	0,82	1,36	0,70	1,72	1,26	-0,46	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6,66	10,94	5,53	10,34	9,97	12,20	12,55	10,69	9,44	10,62	8,09	-2,53	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	9,57	6,25	5,25	7,42	6,62	7,39	5,05	6,62	9,93	8,60	7,81	-0,79	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1,66	1,14	0,45	0,35	2,04	1,16	0,56	1,48	0,41	0,86	0,56	-0,30	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7,07	6,61	3,61	5,40	6,16	3,25	3,47	3,66	4,50	3,83	2,47	-1,36	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	13,45	12,22	5,99	7,97	9,41	6,51	6,68	8,62	9,89	9,72	7,41	-2,30	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	24,83	19,74	17,33	17,51	22,95	25,64	21,33	21,56	22,57	21,11	12,75	-8,36	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	9,43	10,94	7,79	9,33	9,01	6,00	7,50	7,68	10,55	8,94	7,50	-1,44	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	8,60	9,66	7,57	5,70	7,43	6,99	6,22	9,10	7,65	10,06	7,10	-2,96	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,66	0,92	0,68	0,25	1,42	0,96	0,77	0,41	0,57	0,95	0,84	-0,10	
	Condiciones orales (K00-K14)	14,70	18,75	44,04	34,41	20,20	27,19	34,03	28,23	22,20	21,88	42,52	20,63	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	6,98	9,69	10,42	4,31	9,88	9,18	4,18	19,31	15,51	15,14	8,74	-6,40	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	2,33	0,88	0,00	0,00	5,56	2,68	4,50	13,45	1,11	3,79	5,74	1,95	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	2,33	0,00	0,00	1,91	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,55	-0,08	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	88,37	89,43	89,58	93,78	83,33	88,15	91,32	67,24	83,38	80,44	84,97	4,53	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, la primera causa de morbilidad en la población total son las enfermedades infecciosas y parasitarias con 57,54% presentando un aumento de 19,17 comparando el periodo 2019- 2018; seguida de las infecciones respiratorias con 41,43% presentando una disminución de -20,20 comparado con el periodo 2019 – 2018.

Condiciones materno perinatales

La causa de la morbilidad de eventos perinatales de la población total adolescente para el año 2019, son las condiciones maternas con el 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la adolescencia para el periodo 2019, la principal causa de morbilidad en la población total son las condiciones orales con 42,52% presentando un aumento de 20,63 comparando el periodo 2019 -2018; la segunda son las enfermedades genitourinarias con el 12,75% presentando una disminución de -8,36 comparando el periodo 2019 -2018; la tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un 8,09% presentando una disminución de -2,53 comparando el periodo 2019 -2018.

Lesiones

Para la población total de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 84,97% presentando un aumento del 4,53 comparando el periodo 2019 – 2018; seguido de las lesiones no intencionales con 8,74% presentando una disminución de -6,40 comparado con el periodo 2019 - 2018.

Tabla 62. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Adolescencia, población Masculina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00- B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D63, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03- G04, N70-N73)	56,19	50,12	55,02	47,51	39,68	59,32	67,70	50,70	40,53	36,23	52,85	16,62
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	42,92	49,88	44,29	50,92	58,49	39,66	31,42	46,98	59,47	63,77	45,95	-17,82
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D63, D64.9, E51-E64))	0,88	0,00	0,69	1,57	1,83	1,02	0,88	2,33	0,00	0,00	1,20	1,20
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#DNV0!	0,00	#DNV0!									
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DNV0!	100,00	#DNV0!									
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00- D48, D65-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03- E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68- H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75- N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	2,84	0,00	0,56	0,55	0,81	0,19	0,40	0,32	0,25	0,87	0,50	-0,17
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,00	0,00	0,69	0,54	0,19	0,53	0,16	1,26	1,61	0,57	-1,04
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,28	0,27	0,27	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03- E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,76	2,36	0,85	0,00	2,02	1,76	1,34	1,12	0,50	1,88	1,08	-0,80
	Condiciones neuropsiquiáticas (F01-F99, G06-G98)	4,85	12,42	6,07	13,72	11,56	7,51	12,17	11,48	12,06	11,96	9,12	-2,84
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	14,98	8,57	5,51	6,31	9,14	10,85	9,09	6,22	10,18	8,87	7,90	-0,97
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0,88	1,71	0,28	0,14	4,57	2,32	0,94	3,03	0,75	2,15	1,15	-1,00
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	14,10	10,71	3,11	8,37	8,60	5,10	3,74	4,78	7,79	6,99	3,88	-3,11
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3,52	6,85	4,52	6,17	7,66	5,84	5,61	5,10	5,53	9,81	5,75	-4,06
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	6,61	6,64	5,23	4,25	8,60	10,02	3,48	6,22	8,42	4,84	3,74	-1,10
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	13,66	13,06	9,04	12,07	11,16	9,37	12,43	13,40	13,69	11,42	6,82	-4,60
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	15,42	13,70	11,30	6,45	10,75	10,20	7,62	12,28	9,80	12,23	7,33	-4,90
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	3,08	0,86	0,71	0,27	1,34	2,04	1,34	0,80	1,51	1,48	1,08	-0,40
	Condiciones orales (K00-K14)	18,50	23,13	52,54	40,74	22,98	33,77	41,31	35,09	28,27	26,08	51,08	25,00
	Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7,84	4,11	7,87	4,96	6,56	8,72	4,10	25,28	15,47	13,22	7,91
Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	3,37	1,10	0,57	3,16	2,59
Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)		0,00	0,00	0,00	2,84	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,79	-0,36
Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)		92,16	95,89	92,13	92,20	91,26	91,28	88,72	71,35	83,43	85,06	88,14	3,08
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el periodo 2019 la primera causa de morbilidad en la población masculina adolescente, son las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 52,85% presentando un aumento del 16,62 comparado con el periodo 2019 – 2018; seguido de las infecciones respiratorias con 45,95% presentando una disminución de -17,82 comparando el periodo 2019 – 2018.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se reportan eventos

Enfermedades no transmisibles

En la adolescencia para el periodo 2019, la principal causa de morbilidad en la población de los hombres son las condiciones orales con 51,08% presentando un aumento del 25,00 comparando el periodo 2019 – 2018; la segunda causa son las condiciones neuropsiquiaticas con 9,12% presentando una disminución de -2,84 comparando el periodo 2019 -2018; La tercera causa son las enfermedades de órganos de los sentidos con 7,90% presentando una disminución de -0,97 comparando el periodo 2019 – 2018.

Lesiones

Para la población masculina de la adolescencia, durante el periodo 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 88,14% presentando un aumento de 3,08 comparando el periodo 2019 – 2018; le sigue las lesiones no intencionales con 7,91% mostrando una disminución de -5,31 comparando el periodo 2019 -2018.

Tabla 63. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Adolescencia, población Femenina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	54,35	55,50	52,14	58,66	48,76	53,31	64,88	55,81	42,25	40,26	61,02	20,77
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	43,84	42,62	44,65	40,31	49,21	44,64	35,12	43,45	56,63	59,74	38,08	-21,66
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1,81	1,87	3,21	1,03	2,02	2,05	0,00	0,75	1,12	0,00	0,89	0,89
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100,00	98,65	100,00	96,26	99,08	95,45	99,34	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0,00	1,35	0,00	3,74	0,92	4,55	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0,20	0,00	0,19	0,00	0,49	0,16	0,17	0,00	0,48	0,00	0,18	0,18
	Otras neoplasias (D00-D48)	0,00	0,21	0,09	0,00	0,08	0,53	0,91	0,66	0,91	1,14	0,41	-0,72
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,32	1,48	1,16
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	1,21	2,87	1,51	1,20	4,91	1,91	0,50	1,50	0,79	1,64	1,38	-0,26
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7,49	10,20	5,17	8,38	9,01	14,25	12,79	10,23	8,18	9,99	7,42	-2,56
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	7,09	5,10	5,08	8,06	5,08	5,86	2,56	6,85	9,82	8,47	7,75	-0,72
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	2,02	0,85	0,56	0,48	0,49	0,65	0,33	0,56	0,24	0,25	0,18	-0,07
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3,85	4,57	3,95	3,67	4,67	2,44	3,30	3,00	2,91	2,34	1,57	-0,77
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	18,02	14,88	6,96	9,02	10,48	6,80	7,34	10,69	12,00	9,67	8,48	-1,19
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	33,20	26,25	25,40	25,22	31,70	32,49	32,34	30,58	29,39	28,76	18,53	-10,23
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7,49	9,88	6,96	7,74	7,70	4,52	4,46	4,32	9,03	7,77	7,93	0,15
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5,47	7,65	5,08	5,27	5,41	5,58	5,36	7,22	6,61	9,04	6,96	-2,08
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	1,01	0,96	0,66	0,24	1,47	0,49	0,41	0,19	0,12	0,70	0,69	0,00
	Condiciones orales (K00-K14)	12,96	16,58	38,38	30,73	18,51	24,31	29,54	24,20	19,27	19,91	37,02	17,11
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5,71	19,75	15,38	2,94	14,18	9,90	4,31	9,82	15,56	17,48	10,62	-6,86
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	5,71	2,47	0,00	0,00	12,77	6,93	0,00	29,46	1,11	7,69	11,50	3,81
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	82,86	77,78	84,62	97,06	73,05	83,17	95,69	60,71	83,33	74,83	77,88	3,05
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, la primera causa de morbilidad en la población de las niñas son las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 61,02% mostrando un aumento del 20,77 comparando el periodo 2019 – 2018; y la segunda causa son las infecciones respiratorias con 38,08% presentando una disminución considerable de – 21,61 comparando el periodo 2019 – 2018.

Condiciones materno perinatales

La causa de la morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas el 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la adolescencia para el periodo 2019, la principal causa de morbilidad en la población de las adolescentes son las condiciones orales con 37,02% presentando un aumento del 17,11 comparado con el periodo 2019 -2018; la segunda causa son las enfermedades genitourinarias con 18,53% presentando una disminución de -10,23 comparando el periodo 2019 -2018; la tercera causa son las enfermedades digestivas con 8,48% presentando una disminución de -1,19 comparando el periodo 2019 -2018.

Lesiones

Para la población femenina de la adolescencia, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con el 77,88% presentando un aumento de 3,05 comparando los periodos 2019 – 2018; la segunda causa son las lesiones intencionales con 11,50% presentado un aumento de 3,81 comparando los periodos 2019 -2018

Tabla 64. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Juventud, Total población. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-B99, G00, G03-G04, N70-N73)		59.02	48.23	51.23	47.23	46.82	57.00	70.29	52.89	55.04	46.00	66.24	20.24
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	40.06	48.08	46.15	51.72	43.17	42.03	28.87	46.53	44.57	53.64	33.64	-20.00
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0.92	3.69	2.62	1.05	10.01	0.97	0.84	0.58	0.39	0.36	0.12	-0.24
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	99.22	100.00	99.67	98.27	96.66	98.48	100.00	100.00	100.00	100.00	99.39	-0.61
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0.78	0.00	0.33	1.73	3.34	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.00	0.05	0.38	1.79	0.54	0.58	0.15	1.49	0.47	0.37	0.58	0.21
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.61	0.47	0.34	0.99	0.85	0.73	0.35	1.07	0.75	0.70	0.69	-0.01
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.09	0.26	0.21	0.11	0.12	0.23	0.05	0.18	0.41	0.27	0.11	-0.16
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	2.77	2.41	1.87	1.83	1.24	1.67	1.63	1.61	2.64	2.90	2.61	-0.29
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	11.01	11.59	8.99	10.38	12.95	13.96	14.78	13.79	12.77	11.91	10.20	-1.70
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	3.64	4.56	5.28	4.16	4.92	3.89	3.56	4.64	5.66	5.67	8.62	2.95
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1.21	1.42	2.00	1.22	1.43	1.06	1.68	1.49	1.42	1.53	1.77	0.23
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4.59	4.56	3.92	3.74	3.72	2.43	1.58	1.96	3.56	3.00	2.37	-0.63
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10.83	10.75	6.35	8.93	9.26	7.71	9.89	8.80	8.43	10.34	10.18	-0.16
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	40.03	28.42	30.51	28.78	37.21	33.60	29.36	33.65	32.99	33.02	27.26	-5.76
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	6.07	6.97	5.84	5.88	5.97	3.46	4.60	6.00	6.61	5.47	5.33	-0.14
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	7.02	9.44	8.82	6.11	6.40	6.12	9.10	6.54	8.37	8.91	8.86	-0.05
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.00	0.37	0.34	0.08	2.29	0.33	0.49	0.42	0.75	0.20	0.37	0.17
	Condiciones orales (K00-K14)	12.13	18.72	25.14	25.99	13.10	24.22	22.79	18.37	15.18	15.71	21.07	5.35
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	7.95	4.82	9.81	6.22	6.06	10.94	7.35	11.11	10.05	12.53	7.43	-5.10
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.40	1.87	1.44	1.35	0.52	2.45	1.39	4.64	3.01	1.91	-1.10
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1.14	0.40	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.52	1.00	0.00	-1.00
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90.91	94.38	88.32	92.34	92.59	88.28	90.20	87.50	84.79	83.46	90.66	7.20
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitaria con 66.2% con tendencia a aumentar en 20.2 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 33.6% con tendencia a disminuir en 20 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2018, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 99.3%. Con tendencia al disminuir en 0,61 puntos en relación al año 2018.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 27.2% de frecuencia con tendencia a disminuir en 5.7 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 21.07% con tendencia a aumentar en 5.3 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un registro de 10.2% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 1.7 puntos.

Lesiones

Para la población total de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90.6% con tendencia a aumentar en 7.2. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7.43% con tendencia a disminuir en 5.1.

Tabla 65. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Juventud, población Masculina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	59.46	39.38	50.00	52.51	49.79	60.28	69.27	50.00	63.61	49.10	69.72	20.63
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	40.54	60.18	47.00	47.49	50.21	39.72	30.73	49.21	36.39	50.90	30.28	-20.63
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	0.00	0.44	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!							
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!							
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D65-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E85-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30, J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	1.30	0.00	0.23	1.07	0.11	0.45	0.34
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.75	0.20	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	1.64	0.24	0.44	0.54	0.10
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.00	0.00	0.17	0.29	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desórdenes endocrinos (D65-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E85-E88)	1.88	0.39	1.54	0.58	0.30	0.60	1.12	1.40	0.95	1.31	0.80	-0.51
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	23.31	23.05	14.19	23.87	25.42	23.03	30.28	26.87	19.67	15.85	10.00	-5.85
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6.39	7.42	7.69	7.13	10.35	6.78	5.42	4.21	8.29	5.79	9.38	3.58
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	0.75	1.56	2.56	1.16	1.52	2.49	2.43	1.17	2.61	3.28	1.16	-2.12
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	7.14	7.42	5.30	3.35	3.96	3.29	1.68	3.50	3.44	2.62	2.59	-0.03
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10.90	7.81	5.47	10.48	7.91	7.98	6.17	6.31	9.12	9.62	10.89	1.28
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	12.78	13.28	12.65	10.48	15.83	10.87	7.29	10.51	19.43	26.67	26.79	0.12
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7.89	7.03	11.97	8.44	9.89	6.88	6.92	10.05	9.24	6.34	5.71	-0.62
	Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99)	13.53	15.23	11.28	8.01	10.96	11.86	15.33	11.68	11.37	12.88	10.27	-2.41
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.00	0.39	0.51	0.00	0.46	0.00	0.37	0.47	0.47	0.33	0.45	0.12
Condiciones orales (K00-K14)	14.86	16.21	26.67	26.20	12.33	24.43	22.99	21.96	14.10	14.97	20.98	6.01	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	9.84	4.15	5.56	5.84	3.57	9.58	2.78	11.56	8.88	11.54	7.89	-3.64
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.52	0.69	0.65	0.51	0.42	0.56	0.68	1.87	1.15	0.33	-0.82
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	-1.54
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	90.16	95.34	93.75	93.51	95.92	89.58	96.67	87.76	89.25	85.77	91.78	6.01
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad es por enfermedades infecciosas y parasitarias con 69.7% con tendencia a aumentar en 20.6 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 30.2% con tendencia a disminuir en 20.3 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las condiciones genitourinarias con 26,7% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0.12 puntos, la segunda causa las condiciones orales con 20.9% y crecimiento de 6.01%, seguida de las enfermedades musculo-esqueleticas con un 10.2% y disminución de 2.4% con respecto al año 2018.

Lesiones

Para la población masculina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91.7% con tendencia a aumentar en 6.01 puntos. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7.89% con tendencia a disminuir en 3.64 puntos.

Tabla 66. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Juventud, población Femenina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	58.80	52.94	51.82	43.90	45.42	54.55	70.98	54.55	48.00	43.99	64.11	20.12
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	39.81	41.65	45.74	54.39	39.84	43.76	27.62	45.00	51.29	55.43	35.70	-19.72
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1.39	5.41	2.43	1.71	14.74	1.69	1.40	0.45	0.71	0.59	0.19	-0.40
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	99.20	100.00	99.67	98.26	96.66	98.48	100.00	100.00	100.00	100.00	99.39	-0.61
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0.80	0.00	0.33	1.74	3.34	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.00	0.07	0.51	2.43	0.47	0.34	0.20	1.91	0.24	0.48	0.64	0.16
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.56	0.57	0.45	1.35	1.04	0.88	0.47	0.88	0.95	0.82	0.75	-0.07
	Diabetes mellitus (E10-E14)	0.11	0.36	0.23	0.05	0.16	0.24	0.07	0.24	0.57	0.38	0.15	-0.23
	Desórdenes endocrinos (D65-D64 excepto E65-E88)	3.04	3.15	1.99	2.28	1.56	2.03	1.81	1.67	3.32	3.60	3.37	-0.23
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	7.32	7.38	7.26	5.59	8.68	10.87	9.21	9.33	10.01	10.18	10.29	0.11
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	2.82	3.51	4.48	3.10	3.07	2.91	2.89	4.78	4.60	5.62	8.31	2.69
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	1.35	1.36	1.82	1.24	1.40	0.58	1.41	1.59	0.95	0.77	2.02	1.25
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3.83	3.51	3.46	3.88	3.64	2.13	1.55	1.44	3.61	3.17	2.28	-0.89
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	10.81	11.83	6.64	8.38	9.72	7.62	11.22	9.65	8.16	10.66	9.88	-0.78
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	48.20	33.98	36.44	35.28	44.51	41.33	37.30	41.55	38.43	35.81	27.46	-8.35
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	5.52	6.95	3.80	4.97	4.63	2.30	3.76	4.63	5.55	5.09	5.16	0.07
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	5.07	7.31	8.00	5.43	4.84	4.17	6.85	4.78	7.16	7.25	8.27	1.02
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.00	0.36	0.28	0.10	2.91	0.44	0.54	0.40	0.85	0.14	0.34	0.19
Condiciones orales (K00-K14)	11.37	19.64	24.63	25.92	13.36	24.15	22.72	17.15	15.61	16.03	21.10	5.07	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3.70	7.14	18.57	7.27	10.89	13.19	20.00	10.14	11.49	14.39	6.59	-7.80
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	4.29	3.64	2.97	0.69	7.69	2.90	8.05	6.47	4.79	-1.68
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	3.70	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
	Traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	92.59	91.07	77.14	89.09	86.14	86.11	72.31	86.96	79.31	79.14	88.62	9.49
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina son las enfermedades infecciosas y parasitaria con 66.2% con tendencia a aumentar en 20.2 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 33.6% con tendencia a disminuir en 20 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 99.3%.

Enfermedades no transmisibles

En la juventud en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 27.2% de frecuencia con tendencia a disminuir en 5.7 puntos, la segunda causa las condiciones orales en 21.07% con tendencia a aumentar en 5.3 puntos. La tercera causa son las condiciones neuropsiquiátricas con un peso de 10.2% y un decrecimiento de 1.7%.

Lesiones

Para la población femenina de la juventud, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90.6% con tendencia a aumentar en 7.2%. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7.43% con tendencia a disminuir en 5.10 puntos.

Tabla 67. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Adultez. Total población. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-)	54.06	54.64	51.46	48.42	50.12	48.07	62.11	57.46	49.68	47.49	56.03	8.54
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	44.21	44.60	47.74	51.33	49.41	49.96	36.97	40.46	50.08	51.93	43.68	-8.25
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-)	1.73	0.77	0.80	0.25	0.47	1.97	0.92	2.08	0.24	0.59	0.30	-0.29
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97.47	100.00	99.43	98.72	97.92	97.64	100.00	100.00	100.00	99.04	100.00	0.96
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2.53	0.00	0.57	1.28	2.08	2.36	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	-0.96
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.38	0.49	0.30	1.36	1.88	1.75	1.69	1.65	1.42	1.16	2.07	0.90
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.89	0.65	1.44	1.03	0.72	1.18	1.33	1.34	1.28	1.36	1.45	0.09
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.49	3.51	3.19	3.96	3.88	3.88	2.31	3.54	4.01	4.78	3.67	-1.11
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6.70	9.08	4.36	3.97	2.86	2.93	2.31	2.89	3.32	4.43	4.79	0.36
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	6.11	6.09	5.80	6.16	8.09	9.18	10.96	9.42	9.46	8.88	8.15	-0.73
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4.81	3.38	3.51	3.93	5.42	5.09	3.36	5.35	5.48	5.89	6.01	0.13
	Enfermedades cardiovasculares (I00-)	22.20	21.45	22.54	23.46	24.12	18.45	17.74	14.81	14.98	16.33	14.82	-1.51
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4.06	3.28	3.39	2.66	4.97	2.17	1.99	1.79	2.67	1.95	2.52	0.58
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9.81	8.95	8.59	8.46	7.22	8.16	6.36	7.71	8.80	9.20	10.09	0.89
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	16.68	15.36	18.32	17.66	17.79	20.84	24.29	25.17	20.51	16.68	16.94	0.25
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	4.27	4.98	4.37	3.77	3.85	2.47	2.81	3.51	3.57	3.65	3.57	-0.07
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	14.98	15.16	12.23	11.52	11.76	12.04	14.03	13.94	14.15	15.17	14.20	-0.97
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.03	0.02	0.22	0.17	1.18	0.24	0.17	0.08	0.18	0.13	0.23	0.10
Condiciones orales (K00-K14)	6.60	7.61	11.75	11.88	6.26	11.60	10.66	8.80	10.16	10.39	11.49	1.10	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4.93	6.03	8.31	7.96	12.30	10.69	7.46	19.11	14.24	15.68	13.59	-2.09
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.38	0.22	1.29	0.62	0.46	-0.16
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94.17	93.97	88.36	92.04	87.70	89.18	92.16	80.67	84.46	83.70	85.83	2.13
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total las enfermedades infecciosas y parasitarias con 56.03% con tendencia a aumentar en 9.5 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con un 43.6% con tendencia a disminuir en 8.2 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019, son las condiciones maternas la principal causa con una frecuencia de 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 16.9% de frecuencia con tendencia a aumentar en 0.2 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 14.82% con tendencia a disminuir en 1,5 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo-esqueléticas con un registro de 14.2% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 0.97 puntos.

Lesiones

Para la población total de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 85.8% con tendencia a aumentar en 2.1%. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 13.5% con tendencia a disminuir en 2,09%.

Tabla 68. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Adultez. Población masculina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	56.11	61.29	50.14	51.72	55.91	53.88	66.34	68.90	53.32	53.97	60.83	6.87
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	42.75	38.25	49.28	48.05	43.71	44.23	33.66	29.88	46.44	46.03	38.97	-7.07
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))	1.15	0.46	0.58	0.23	0.38	1.89	0.00	1.22	0.25	0.00	0.20	0.20
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.11	0.49	0.35	0.96	0.98	1.23	2.31	1.67	1.21	0.77	3.27	2.50
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.44	0.55	0.30	0.48	0.16	0.78	2.16	1.13	1.10	0.62	0.59	-0.04
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.21	5.61	4.32	5.14	4.16	3.63	2.40	3.87	3.97	4.92	3.63	-1.28
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6.97	8.93	3.48	4.01	2.04	1.88	1.13	2.14	2.12	2.90	2.15	-0.75
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	8.08	9.98	10.98	9.02	9.91	11.96	16.43	14.82	14.57	13.94	11.46	-2.48
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6.64	6.41	5.91	4.75	6.65	6.10	4.12	6.31	6.93	7.38	6.71	-0.67
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	16.15	14.79	15.31	18.74	18.31	16.05	14.52	12.32	13.44	14.50	13.03	-1.47
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	1.99	1.79	1.74	2.00	11.34	2.63	2.31	2.50	2.69	1.94	2.38	0.43
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	11.62	9.55	9.99	10.15	8.24	10.96	7.99	8.51	10.14	10.31	10.12	-0.19
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	9.18	10.10	10.39	10.98	11.54	11.96	14.12	12.50	10.07	8.59	15.71	7.12
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	7.08	6.10	7.16	5.27	5.38	4.12	4.81	5.30	5.11	5.21	5.26	0.04
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	22.01	16.45	16.00	14.29	13.17	15.40	16.09	18.75	16.54	17.58	13.61	-3.96
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.00	0.00	0.20	0.13	0.61	0.10	0.15	0.06	0.08	0.00	0.11	0.11
Condiciones orales (K00-K14)	7.52	9.24	13.87	14.07	7.50	13.20	11.48	10.12	12.04	11.34	11.97	0.63	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4.86	4.82	5.28	6.73	11.04	9.69	6.13	20.41	11.21	14.84	16.70	1.86
	Lesiones intencionales (X80-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.28	0.34	0.43	0.23	0.00	-0.23
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	93.75	95.18	89.79	93.27	88.96	90.10	93.59	79.25	88.36	84.93	83.13	-1.80
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2018, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 60.8% con tendencia a aumentar en 6.87 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias 38.9% con tendencia a disminuir en 7 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población masculina para el año 2019, no se registraron eventos.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genitourinarias con 15.7% de frecuencia con tendencia a aumentar en 7.1 puntos, la segunda causa las enfermedades musculo-esqueléticas en 13.6% con tendencia a disminuir en 3.9 puntos. La tercera causa son las enfermedades cardiovasculares con un registro de 13.03% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 1,4 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 83.1% con tendencia a disminuir en 1.8. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 16.7% con tendencia a aumentar en 4,86 puntos.

Tabla 69. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Adultez. Población Femenina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	52.97	50.74	52.05	46.53	45.90	44.98	59.82	50.47	47.94	43.69	53.15	9.46	
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	44.99	48.31	47.05	53.21	53.55	53.01	38.76	46.93	51.83	55.38	46.49	-8.89	
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	2.04	0.94	0.90	0.26	0.55	2.01	1.42	2.61	0.24	0.93	0.36	-0.57	
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	97.47	100.00	99.43	98.72	97.92	98.31	100.00	100.00	100.00	99.04	100.00	0.96	
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	2.53	0.00	0.57	1.28	2.08	1.69	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	-0.96	
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.47	0.49	0.28	1.52	2.25	1.93	1.44	1.64	1.50	1.31	1.52	0.21	
	Otras neoplasias (D00-D48)	1.04	0.69	1.86	1.25	0.95	1.32	1.00	1.42	1.35	1.64	1.84	0.19	
	Diabetes mellitus (E10-E14)	2.58	2.75	2.77	3.51	3.76	3.97	2.27	3.41	4.03	4.72	3.69	-1.04	
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	6.62	9.13	4.69	3.96	3.20	3.31	2.77	3.17	3.78	5.02	5.98	0.96	
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	5.47	4.69	3.88	5.06	7.33	8.20	8.82	7.41	7.52	6.95	6.66	-0.30	
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4.22	2.29	2.62	3.61	4.91	4.74	3.06	4.99	4.93	5.32	5.70	0.38	
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	24.15	23.85	25.23	25.29	26.54	19.30	19.00	15.74	15.57	17.03	15.63	-1.40	
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	4.72	3.82	4.00	2.92	2.32	2.01	1.87	1.53	2.66	1.95	2.59	0.64	
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	9.23	8.73	8.06	7.81	6.79	7.17	5.72	7.41	8.30	8.78	10.08	1.30	
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	19.11	17.26	21.26	20.25	20.39	23.97	28.28	29.89	24.47	19.76	17.49	-2.27	
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3.36	4.57	3.34	3.19	3.22	1.89	2.02	2.84	2.99	3.05	2.82	-0.23	
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12.70	14.70	10.83	10.45	11.18	10.86	13.23	12.15	13.24	14.25	14.46	0.20	
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.04	0.02	0.22	0.19	1.42	0.29	0.17	0.09	0.22	0.18	0.29	0.11	
	Condiciones orales (K00-K14)	6.30	7.02	10.96	11.02	5.74	11.04	10.34	8.31	9.45	10.03	11.27	1.24	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5.06	8.33	14.60	10.71	14.71	12.26	10.37	16.67	20.35	17.48	7.69	-9.78	
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	3.03	1.46	1.34	-0.12	
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94.94	91.67	85.40	89.29	85.29	87.74	89.02	83.33	76.62	81.07	90.97	9.90	
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población femenina las enfermedades infecciosas y parasitarias con 53.1% con tendencia a aumentar en 9.4 puntos con relación al 2018, seguida de las infecciones respiratorias con 46.9% con tendencia a disminuir en 8.8 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población femenina para el año 2019 se registraron eventos de condiciones maternas en un 100%.

Enfermedades no transmisibles

En la adultez en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población femenina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades genito-urinarias con 17.4% de frecuencia con tendencia a disminuir en 2.2 puntos, la segunda causa las enfermedades cardiovasculares en 15.6% con tendencia a disminuir en 1,4 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculo-esqueléticas con un registro de 14,4% .

Lesiones

Para la población femenina de la adultez, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 90.9% con tendencia a aumentar en 9.9. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 7.69% con tendencia a disminuir en 9.7 puntos.

Tabla 70. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Vejez. Total, población. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	47.25	53.05	46.04	51.08	48.68	49.73	57.97	53.74	51.90	48.78	44.08	-4.70
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	51.83	45.82	53.13	47.84	51.32	46.81	37.07	44.25	46.03	48.93	54.42	5.49
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0.92	1.13	0.83	1.08	0.00	3.46	4.96	2.01	2.07	2.29	1.50	-0.79
Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96)	Condiciones maternas (O00-O99)	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!								
	Condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96)	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!								
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.80	0.62	0.57	1.08	0.79	1.55	1.26	2.12	1.68	1.66	1.63	-0.03
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.31	0.23	0.39	0.33	0.26	0.23	0.17	0.47	0.62	0.50	0.70	0.20
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3.52	3.58	3.62	4.36	4.16	4.54	3.16	4.82	5.34	5.61	4.83	-0.78
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3.33	7.80	3.48	1.82	1.13	1.77	1.09	1.95	2.08	3.82	3.17	-0.65
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	2.03	2.22	1.83	1.79	1.67	2.34	2.78	3.92	3.08	2.58	2.76	0.18
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	5.50	4.14	3.56	4.16	5.12	4.46	3.10	5.37	4.14	4.34	4.79	0.45
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	57.91	54.96	60.03	60.38	60.30	52.53	49.19	45.66	42.64	42.95	42.97	0.02
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	3.78	3.60	3.25	3.45	4.08	3.59	2.16	2.59	3.36	2.91	3.93	1.02
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	4.43	4.90	5.10	4.41	3.56	4.93	3.58	5.35	4.78	4.72	4.76	0.04
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4.55	4.86	6.58	6.28	6.72	12.63	21.70	14.37	19.04	17.75	17.57	-0.18
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3.13	2.84	2.68	2.40	2.34	2.00	2.27	1.93	2.15	2.73	1.83	-0.90
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	9.52	8.79	7.10	7.79	8.23	7.22	8.20	9.33	9.35	8.12	8.78	0.66
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.08	0.14	0.08	0.12	0.83	0.11	0.03	0.00	0.07	0.02	0.03	0.01
	Condiciones orales (K00-K14)	1.11	1.30	1.72	1.62	0.80	2.10	1.32	2.12	1.68	2.28	2.25	-0.03
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	4.55	2.54	10.38	13.71	10.34	11.21	9.28	5.92	9.06	12.00	8.00	-4.00
	Lesiones intencionales (X80-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.24	0.24
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	95.45	97.46	89.62	85.89	89.66	88.79	90.72	94.08	90.55	88.00	91.29	3.29
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población total infecciones respiratorias con 54.4% con tendencia aumentar en 5.4 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 44,08% con tendencia a disminuir en 7.7 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2018, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En personas mayores en el año 2018, la principal causa de morbilidad en la población total en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 42,97% de frecuencia con tendencia a disminuir en 0,02 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 17.5% con tendencia a una leve disminución de 0,1 punto. La tercera causa son las enfermedades musculo esqueléticas con un registro de 8,78% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 0.6 puntos.

Lesiones

Para la población total de las Personas Mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91.2% con tendencia al incremento en 3.29%. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con 8% con tendencia a disminuir en 4 puntos.

Tabla 71. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Vejez. Población masculina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Hombres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00-G03-G04, N70-N73)	39.33	47.92	41.62	56.91	56.22	53.64	57.80	54.32	53.88	48.16	40.83	-7.33
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	60.67	50.52	56.07	42.68	43.78	42.05	41.04	43.83	42.86	50.17	58.28	8.12
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	0.00	1.56	2.31	0.41	0.00	4.31	1.16	1.85	3.27	1.67	0.89	-0.78
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	1.07	0.91	0.73	1.50	0.90	2.38	1.61	2.65	1.83	2.93	2.43	-0.50
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.44	0.27	0.33	0.43	0.22	0.23	0.27	0.45	0.77	0.54	0.65	0.11
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3.73	2.58	3.83	4.28	3.50	3.15	1.88	3.40	4.86	3.54	3.74	0.20
	Desórdenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)	3.37	6.29	3.26	1.40	1.08	1.20	0.88	1.20	1.09	2.17	1.49	-0.69
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	1.95	2.04	1.83	2.17	2.54	3.02	2.91	4.90	3.00	3.03	2.80	-0.22
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	6.66	5.48	4.20	5.48	6.19	6.01	3.83	6.25	4.72	5.22	4.58	-0.64
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	48.76	49.44	53.40	50.87	51.30	46.27	44.53	39.47	38.19	38.45	36.85	-1.60
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	5.95	5.37	5.13	5.05	6.32	5.24	3.71	2.70	4.20	4.08	5.17	1.09
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	5.06	5.16	5.30	5.48	4.02	5.04	4.40	6.45	4.63	5.74	4.64	-1.09
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4.97	5.80	9.41	8.56	7.55	14.52	23.12	18.11	21.93	19.38	25.22	5.84
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	3.64	4.14	2.73	2.67	2.85	2.43	2.79	2.15	2.26	3.13	1.82	-1.31
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	12.52	10.69	7.90	9.93	10.74	7.78	8.42	9.95	10.43	8.94	8.03	-0.90
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.00	0.16	0.08	0.03	1.64	0.05	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
	Condiciones orales (K00-K14)	1.87	1.67	1.87	2.14	1.15	2.70	1.61	2.30	2.06	2.86	2.57	-0.28
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	3.77	2.78	11.88	14.08	9.42	12.43	9.29	4.08	11.33	12.50	12.30	-0.20
	Lesiones intencionales (X80-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	96.23	97.22	88.12	85.92	90.58	87.57	90.71	95.92	88.67	87.50	86.63	-0.87
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las infecciones respiratorias con 58.2% con tendencia a aumentar en 8.1 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 40.8% con tendencia a disminuir en 7.3 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En personas mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 36.8% de frecuencia con tendencia a disminuir en 1.6 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 25.2% con tendencia a aumentar en 5.8 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 8.03% con tendencia a disminuir con relación al 2018 en 0,9 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de las Personas Mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 86.6% con tendencia a disminuir en 0.8%. Como segunda causa están las lesiones no intencionales con un peso de 12.3%.

Tabla 72. Morbilidad específica por subgrupo de causas, curso de vida Vejez. Población Femenina. Municipio de Algeciras

Grandes causas de morbilidad	Subgrupos de causa de morbilidad	Mujeres											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Δ pp 2019-2018
Condiciones transmisibles y nutricionales (A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04, N70-N73)	52.71	56.97	48.53	46.45	41.77	45.93	58.08	53.23	50.45	49.30	47.42	-1.88
	Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66)	45.74	42.23	51.47	51.94	58.23	51.44	34.71	44.62	48.36	47.89	50.46	2.57
	Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)	1.55	0.80	0.00	1.61	0.00	2.62	7.22	2.15	1.19	2.82	2.13	-0.69
Enfermedades no transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D85-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)	Neoplasias malignas (C00-C97)	0.60	0.43	0.46	0.79	0.72	0.95	1.02	1.72	1.57	0.78	0.95	0.17
	Otras neoplasias (D00-D48)	0.20	0.20	0.44	0.26	0.29	0.23	0.10	0.49	0.50	0.47	0.75	0.28
	Diabetes mellitus (E10-E14)	3.36	4.21	3.49	4.41	4.60	5.53	4.02	5.88	5.69	7.05	5.76	-1.29
	Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto E65-E88)	3.29	8.75	3.62	2.10	1.15	2.17	1.23	2.51	2.80	4.96	4.61	-0.35
	Condiciones neuropsiquiátricas (F01-F99, G06-G98)	2.08	2.34	1.82	1.54	1.09	1.86	2.69	3.18	3.14	2.27	2.72	0.45
	Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93)	4.63	3.31	3.16	3.29	4.41	3.35	2.61	4.72	3.72	3.73	4.97	1.24
	Enfermedades cardiovasculares (I00-I99)	64.83	58.40	64.22	66.65	66.29	57.04	52.31	50.30	45.89	46.07	48.19	2.13
	Enfermedades respiratorias (J30-J98)	2.15	2.50	2.05	2.40	2.80	2.40	1.13	2.51	2.74	2.10	2.88	0.78
	Enfermedades digestivas (K20-K92)	3.96	4.74	4.98	3.71	3.26	4.85	3.02	4.53	4.89	4.02	4.86	0.85
	Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98)	4.23	4.27	4.80	4.79	6.16	11.28	20.75	11.56	16.93	16.62	11.03	-5.59
	Enfermedades de la piel (L00-L98)	2.75	2.04	2.65	2.23	2.00	1.70	1.92	1.76	2.07	2.46	1.84	-0.62
	Enfermedades musculoesqueléticas (M00-M99)	7.25	7.61	6.60	6.37	6.56	6.82	8.04	8.87	8.55	7.56	9.42	1.86
	Anomalías congénitas (Q00-Q99)	0.13	0.13	0.08	0.18	0.29	0.16	0.03	0.00	0.10	0.03	0.05	0.02
Condiciones orales (K00-K14)	0.54	1.07	1.62	1.28	0.58	1.67	1.13	1.98	1.40	1.88	1.97	0.09	
Lesiones (V01-Y89, S00-T98)	Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89)	5.71	2.17	8.54	13.21	11.70	10.00	9.26	8.45	5.77	11.35	4.62	-6.73
	Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871)	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
	Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42
	Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	94.29	97.83	91.46	85.85	88.30	90.00	90.74	91.55	93.27	88.65	94.96	6.31
Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

Condiciones transmisibles y nutricionales

En las condiciones transmisibles y nutricionales para el año 2019, se encuentra como primera causa de morbilidad en la población masculina las infecciones respiratorias con 50,46% con tendencia a aumentar en 2.5 puntos con relación al 2018, seguida de las enfermedades infecciosas y parasitarias 47.2% con tendencia a disminuir en 1.8 puntos.

Condiciones materno perinatales

En cuanto a morbilidad de eventos perinatales de la población total para el año 2019, no se registraron eventos en este subgrupo.

Enfermedades no transmisibles

En personas mayores en el año 2019, la principal causa de morbilidad en la población masculina en el subgrupo de enfermedades no transmisibles está las enfermedades cardiovasculares con 48,1% de frecuencia con tendencia a aumentar en 2.1 puntos, la segunda causa las enfermedades genitourinarias en 11% con tendencia a disminuir en 5.5 puntos. La tercera causa son las enfermedades musculoesqueléticas con un registro de 9.42% con tendencia a aumentar con relación al 2018 en 1,8 puntos.

Lesiones

Para la población masculina de las Personas Mayores, durante el año 2019, la principal causa de morbilidad de las lesiones son los Traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 94.9% con tendencia a aumentar en 6.3%. Como segunda causa están las lesiones no intencionales.

2.2.3 Morbilidad específica salud mental

Se realiza un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad específica en salud mental en el municipio de Algeciras, por ciclo vital y sexo, la fuente de información a utilizar corresponde al link de la bodega de datos de SISPRO. Los datos analizados por categorías, se describen a continuación, en la tabla, principales causas de morbilidad en salud mental, total por curso de vida.

Tabla 73. Morbilidad en salud mental, total por curso de vida Municipio de Algeciras Huila 2009 – 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Total											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5años)	Trastornos mentales y del comportamiento	54.55	14.81	44.44	41.18	86.36	89.13	52.08	88.33	74.42	87.25	89.61	2.36
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Epilepsia	46.45	85.19	55.56	58.82	13.64	10.87	47.92	11.67	25.58	12.75	10.39	-2.36
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	18.18	21.43	75.00	46.15	83.33	69.23	57.45	74.14	97.24	97.27	97.76	0.48
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Epilepsia	81.82	78.57	25.00	53.85	16.67	30.77	42.55	25.86	2.76	2.73	2.24	-0.48
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	44.44	41.82	37.14	69.91	44.26	58.16	59.04	42.05	67.94	72.16	72.88	0.72
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	1.53	12.05	14.77	3.05	3.09	0.00	-3.09
	Epilepsia	55.56	58.18	62.86	30.09	54.10	40.31	28.92	43.18	29.01	24.74	27.12	2.38
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	20.31	15.00	30.95	26.47	35.19	34.12	38.01	70.92	70.73	68.95	67.99	-0.96
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	3.13	1.67	1.59	0.00	0.00	5.88	3.51	3.06	2.09	3.65	0.72	-2.93
	Epilepsia	79.69	85.00	69.05	73.53	64.81	65.88	61.99	29.08	29.27	31.05	32.01	0.96
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	74.49	58.97	67.60	36.18	69.23	45.05	83.56	54.65	54.96	45.85	55.15	9.30
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	1.03	0.62	0.00	0.00	0.12	0.27	0.28	0.74	3.05	0.38	-2.66
	Epilepsia	25.51	41.03	32.40	63.82	30.77	54.95	16.44	45.35	45.64	54.15	44.85	-9.30
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	70.00	57.14	57.83	62.79	65.91	78.79	79.07	72.22	28.57	70.00	82.72	12.72
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	2.33	1.14	0.00	0.00	8.89	0.00	0.00	3.66	3.66
	Epilepsia	30.00	42.86	42.17	37.21	34.09	21.21	20.93	27.78	71.43	30.00	17.28	-12.72

Fuente: Bodega de Datos SISPRO 2020

La tabla anterior nos enseña la morbilidad en salud mental por ciclo vital, se realiza el análisis de cada uno de los grupos:

En la población del ciclo de la primera infancia la principal causa de consulta para el año 2019, son los trastornos mentales y de comportamiento con un 89.6% de proporción, este grupo presento incremento de 2.36% con respecto al año 2018. Seguido en proporción la epilepsia con un 10.34%, con tendencia al aumento de 2.36 puntos de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 a 2018.

En el grupo de infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 97.7% de proporción para el año 2019, presentando un leve incremento de 0.48% en relación al año 2018. Le sigue en proporción Epilepsia con 2.24 % de proporción para el 2019, este grupo presento una leve disminución con respecto al año anterior.

En el grupo de la adolescencia la principal causa de morbilidad en salud mental son los trastornos mentales y de comportamiento con un 72.8 % en proporción para el 2019, presenta una leve tendencia al incremento en 0.7% en relación al año 2018. Le sigue en proporción la epilepsia con un 27.12% presentando un aumento en 2.38 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 y 2018.

Para el ciclo vital de la juventud en el municipio de Algeciras, la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 67.5 % de proporción para el año 2019, se observa una leve disminución de 0.96% entre 2019 a 2018. Le sigue en proporción la Epilepsia con 31.7%, presento un aumento de 1.8%. Y en tercer lugar como causas de consulta en este grupo de edad, los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas con 0.7%, presentando un descenso del 2.8% para el 2019.

En la población del ciclo de la Adulthood la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 54.9% en proporción para el 2019, presenta tendencia al aumento en 10.4 en relación al año 2018. Le sigue en proporción la Epilepsia con un 44.6% presentando una disminución en 7.8 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 y 2018, los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas presentan decrecimiento de 2.58% con respecto al año 2018.

En la población del ciclo de la persona mayor, la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 79.8 % en proporción para el 2019, presenta un aumento de 9.8 en relación al año 2018. Le sigue en proporción la Epilepsia

con un 16.6% presentando una disminución 13.2% de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 y 2018 y los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas presentan crecimiento de 3.5% con respecto al año 2018.

De manera general se observa que las principales causas de morbilidad en salud mental en todos los grupos de ciclo vital son los trastornos mentales y de comportamiento, y la epilepsia, es mínima la proporción de consulta por los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas.

Principales Causas de Morbilidad en salud mental en hombres

A continuación, se describe las principales causas de morbilidad en salud mental para la población masculina del municipio de Algeciras, donde se realiza un análisis de los ciclos vitales, (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, Adultez y persona mayor) teniendo en cuenta las tres principales causas de morbilidad en salud mental en cada uno de los ciclos.

Tabla 74. Principales Causas de Morbilidad en salud mental en hombres Municipio de Algeciras 2009 - 2019

Curso de vida	Morbilidad en salud mental	Hombres												Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	71.43	21.43	23.08	46.15	86.49	95.10	52.38	97.75	66.67	87.80	86.79	0.01	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	28.57	78.57	76.92	53.85	13.51	4.08	47.62	2.25	33.33	12.20	13.21	1.01	
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	23.53	50.00	63.64	35.71	74.42	72.13	62.50	73.47	96.15	98.21	97.88	-0.33	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	76.47	50.00	36.36	64.29	25.58	27.87	37.50	26.53	3.85	1.79	2.12	0.33	
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	66.67	13.33	14.29	64.91	43.24	56.25	64.58	35.71	70.31	78.95	62.50	-16.45	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	6.25	20.83	9.52	6.25	0.00	0.00	0.00	
	Epilepsia	33.33	86.67	85.71	35.09	54.05	37.50	14.58	54.76	23.44	21.05	37.50	16.45	
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	10.20	8.24	8.20	22.54	39.33	19.59	35.71	64.84	67.00	65.38	48.70	-16.69	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	1.55	4.29	0.78	0.49	6.15	0.00	-6.15	
	Epilepsia	89.80	91.76	88.52	77.46	60.67	78.87	60.00	34.38	32.51	28.46	51.30	22.84	
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	58.82	32.65	68.80	50.64	65.86	25.50	56.23	40.20	36.54	35.39	37.93	-2.54	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	2.04	0.85	0.00	0.00	0.25	1.07	0.50	0.96	4.83	0.77	-4.06	
	Epilepsia	41.18	65.31	30.34	49.36	34.14	74.25	42.70	59.30	62.50	59.79	61.30	-1.52	
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	66.67	42.11	52.00	58.33	71.88	70.37	96.88	77.27	5.25	80.00	84.62	-4.62	
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	8.33	3.13	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	6.41	-6.41	
	Epilepsia	33.33	57.89	48.00	33.33	25.00	29.63	3.13	4.55	94.75	20.00	8.97	-11.03	

Fuente: *Aplicativo SISPRO 2020.*

Para la población masculina del municipio de Algeciras en el grupo de primera infancia la principal causa de consulta para el año 2018, son los trastornos mentales y de comportamiento con un 86.7% de proporción, este grupo presento una reducción de 1%

entre 2019 y 2018. Seguido en proporción esta la Epilepsia con un 13.21% con tendencia al incremento en 1 punto de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 a 2018.

En el ciclo de la infancia la principal causa de consulta en salud mental son los trastornos mentales y de comportamiento con un 97.8% de proporción para el año 2019, disminuyendo en 0.3% en relación al año 2018. Le sigue en proporción Epilepsia con 2.12% de proporción para el 2019.

Para el grupo de la adolescencia, la principal causa de morbilidad en salud mental de la población masculina del municipio de Algeciras son los trastornos mentales y de comportamiento con un 62.5% en proporción para el 2019, presenta tendencia decreciente en 16.4 en relación al año 2018. Le sigue en proporción la epilepsia con un 37.5% presentando un incremento de 16.4% de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 y 2018.

En la juventud masculina del municipio de Algeciras, la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 48.7 % de proporción para el año 2019, se observa una disminución de 20.9 de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 a 2018. Le sigue en proporción la Epilepsia con 51.3 %, presentando incremento en 20.98%. Y en tercer lugar como causas de consulta en este grupo de edad, los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas con cero casos y una reducción en relación al año anterior de 6.56%.

En el ciclo de la Adulthood, la epilepsia está en primer lugar con un 61.3% en proporción para el 2019, presenta tendencia de reducción en 1.5% en relación al año 2018. Le sigue en proporción los trastornos mentales y de comportamiento con un 37.9% presentando incremento de 2.5% entre 2019 y 2018. Los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas para el año 2019 presentan reducción de 4 puntos, con respecto al año anterior..

En la población de la persona mayor la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 84.6 % en proporción para el 2019, presenta tendencia al aumento en 4.6% en relación al año 2018. Le sigue en proporción la Epilepsia con un 8.9% presentando una disminución en 11%, posteriormente encontramos Los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas con un crecimiento de 6.4%

Mujeres

Principales Causas De Morbilidad en salud mental en Mujeres.

A continuación, se describe las principales causas de morbilidad para la población Femenina del municipio de Algeciras en el año 2018, donde se realiza un análisis de los ciclos vitales, (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, Adulterez y persona mayor) teniendo en cuenta las tres primeras causas de morbilidad, en cada uno de los ciclos.

Tabla 75. Principales Causas de Morbilidad en salud mental en mujeres. Municipio de Algeciras 2009 - 2019

Ciclo vital	Gran causa de morbilidad	Mujeres											Δ pp 2019-2018
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Primera infancia (0 - 5 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	25.00	7.69	100.00	25.00	66.67	39.39	50.00	61.29	100.00	85.00	95.83	19.83
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Epilepsia	75.00	92.31	0.00	75.00	11.11	60.61	50.00	38.71	0.00	15.00	4.17	-60.83
Infancia (6 - 11 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	0.00	5.56	100.00	58.33	94.29	65.12	28.57	74.63	100.00	95.33	96.97	1.64
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Epilepsia	100.00	94.44	0.00	41.67	5.71	34.88	71.43	25.37	0.00	4.67	3.03	-96.64
Adolescencia (12 - 17 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	33.33	76.00	52.38	75.00	45.83	58.54	51.43	47.83	65.67	62.50	85.19	22.69
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	19.57	0.00	7.50	0.00	-7.50
	Epilepsia	66.67	24.00	47.62	25.00	54.17	40.85	48.57	32.61	34.33	30.00	14.81	-51.19
Juventud (18 - 28 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	47.06	29.73	50.75	35.48	25.76	46.99	40.54	75.68	74.44	68.04	80.61	12.56
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	11.76	5.41	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	6.76	5.56	0.00	1.21	1.21
	Epilepsia	41.18	64.86	49.25	64.52	74.24	42.77	59.46	17.57	20.00	31.96	18.18	-33.78
Adultez (29 - 59 años)	Trastornos mentales y del comportamiento	91.49	83.84	62.92	29.46	73.05	63.57	92.52	72.61	77.83	58.90	71.70	12.80
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
	Epilepsia	8.51	16.16	37.08	70.54	26.95	36.43	7.48	27.39	22.17	41.10	28.30	-32.80
Vejez (60 años y más)	Trastornos mentales y del comportamiento	70.59	63.64	60.34	62.50	61.40	84.62	68.52	57.41	84.09	67.50	76.67	9.17
	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	1.67
	Epilepsia	29.41	36.36	39.66	37.50	38.60	15.38	31.48	42.59	15.91	32.50	21.67	-50.83

Fuente: *Aplicativo SISPRO 2020.*

Para la población femenina en el grupo de primera infancia la causa de consulta para el año 2019, son los trastornos mentales y de comportamiento con un 95.8% de proporción,

este grupo presento un aumento de 10.8% de cambio porcentual en la diferencia de la proporción entre 2019 y 2018, seguido de la consulta por Epilepsia con 4.17% y decrecimiento de 10.8% en relación al año 2018.

En el ciclo de la infancia la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 96.9% de proporción para el año 2019, con un crecimiento de 1.6%. Le sigue en proporción la epilepsia con 3%.

Para el grupo de la adolescencia femenina del municipio de Algeciras, la principal causa de morbilidad en salud mental son los trastornos mentales y de comportamiento con un 85.9% en proporción para el 2019, con un crecimiento de 22.6% con respecto al año 2018. Le sigue en proporción la epilepsia con un 14.8%, con una reducción de 15.1%. Los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas para la vigencia no reportan eventos de tal manera que presentan una reducción de 7.5%.

En la juventud del municipio de Algeciras, la principal causa de consulta es son los trastornos mentales y de comportamiento con un 80% de proporción para el año 2019, con un incremento de 12.5%. Le sigue en proporción la epilepsia con 18,1% de proporción para el 2019, con un decrecimiento de 13.7%. Los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas presentan 1.2%.

En el ciclo de la Adultez, los trastornos mentales y de comportamiento están en primer lugar con un 71.7% en proporción para el 2019, con un crecimiento de 12.8%. Le sigue en proporción la Epilepsia con un 28.3%.

En la población de la persona mayor la principal causa de consulta son los trastornos mentales y de comportamiento con un 76.6 % en proporción para el 2019, con un crecimiento del 9.1%. Le sigue en proporción la Epilepsia con un 21.6% y un decrecimiento del 10.8% y los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas presentan el 1.6%.

A continuación, se realiza una estimación de los siguientes indicadores, prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o

reemplazo renal, incidencia de VIH notificada, incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada e incidencia de leucemia linfocítica aguda en menores de 15 años notificada; como fuentes de información se utilizarán las bases de datos de la cuenta de alto costo y las bases de datos del SIVIGILA gestionados a través de SISPRO.

El análisis se realizó a través de metodología descriptiva con estimación de medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) razones de prevalencia e incidencia, con sus respectivos intervalos de confianza al 95%.

Principales Causas de Morbilidad Servicios ESE Hospital Municipal de Algeciras 2018

A continuación, se presenta la dinámica de la morbilidad del municipio de Algeciras para el año 2018, tomando como fuente de información los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) en las áreas de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización y referencia, para la estimación de la tasa de morbilidad se tomó como denominador la población total del municipio de Algeciras para el año 2018.

2.2.4 Morbilidad eventos de alto costo


Tabla 76 Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del Municipio de Algeciras, 2006 – 2018

Evento	Huila	2018	Algeciras 2018	Comportamiento														
				2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal.	1,29		0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliados	9,82		9,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗
Tasa de incidencia de VIH notificada	17,24		27,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años)	1,11		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↗	↘
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfóide (menores de 15 años)	6,64		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO, 2019.

En la tabla para la cuenta de alto costo, se observa que, para el municipio de Algeciras, la incidencia de enfermedad renal crónica fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal presento un aumento a nivel municipal, sin superar la tasa del departamento. La tasa de incidencia VIH Notificada presentó un aumento superando la tasa del departamento.

Figura 59. Progresión de Enfermedad Renal Crónica, Municipio de Algeciras, 2018



Fuente: SISPRO, 2019.

En la gráfica anterior, se evidencia la alta progresión de enfermedad renal crónica en fase inicial, además se observa la frecuencia del evento de acuerdo con los estadios de la enfermedad en la población del municipio, los estadios que más reportan casos son el estadio 0 con el 64,8%, seguido por el estadio 3 con el 4,1% y el estadio 2 con el 2%.

2.2.5 Morbilidad de eventos precusores

Con relación a los eventos precusores, el municipio de Algeciras presenta indicadores de prevalencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial con un comportamiento más bajo que el departamento y con tendencia a la disminución a nivel municipal.

Tabla 77. Eventos precusores, Municipio de Algeciras, 2011 – 2018


Evento	Huila	Algeciras	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalencia de diabetes mellitus	2,69	1,00	-	-	-	-	-								
Prevalencia de hipertensión arterial	5,90	4,50	-	-	-	-	-								

Fuente: SISPRO, 2019

2.2.6 Morbilidad Población Migrante

El municipio de Algeciras presenta atención en salud a un solo caso de población migrante registrada para el 2018, que corresponde a una persona de sexo femenino entre 25 a 29 años. Es importante identificar la población real a fin de establecer necesidades y prioridades de intervención.

FIGURA 60 Piramide poblacional Migrantes atendidos 2019



Fuente: SISPRO 2020

La población del Municipio corresponde al 0.19% del total de la población migrante del departamento y de esta el 60% corresponde a población femenina

Tabla 78. Servicios prestados a la población migrante 2019

Tipo de atención	Total Migrantes atendidos ALGECIRAS		Total Migrantes atendidos HUILA		Concentración ALGECIRAS
	2019	Distribución	2019	Distribución	2019
Consulta Externa	5	24%	1,992	32%	0.3%
Servicios de urgencias	4	19%	696	11%	0.6%
Hospitalización		0%	423	7%	0.0%
Procedimientos	5	24%	1,898	30%	0.3%
Medicamentos	5	24%	1,102	18%	0.5%
Nacimientos	2	10%	167	3%	1.2%
Total	21	100%	6,278	100%	0.3%

Fuente: Base de datos SISPRO 2020.

En la tabla anterior se presenta la atención por servicios prestada a la población migrante en el municipio de Algeciras se identifica una atención a un paciente donde se presta el servicio de consulta externa, procedimientos y medicamentos.

Tabla 79. Lugar de procedencia de la población migrante 2019.

ALGECIRAS	Pais de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		HUILA	Pais de procedencia del migrante	Total de Atenciones en salud según procedencia		Concentración de la atención población migrante
		2019	Proporción			2019	Distribución	2019
ALGECIRAS	Brasil		0%	HUILA	Brasil	10	0%	0.0%
	Ecuador		0%		Ecuador	35	1%	0.0%
	Nicaragua		0%		Nicaragua	3	0%	0.0%
	Otros		0%		Otros	188	7%	0.0%
	Panamá		0%		Panamá	3	0%	0.0%
	Perú		0%		Perú	15	1%	0.0%
	República Bolivariana de Venezuela	5	100%		República Bolivariana de Venezuela	1917	76%	0.3%
	Sin identificador de pais		0%		Sin identificador de pais	364	14%	0.0%
	Total	5	100%		Total	2535	100%	0.2%

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

La totalidad de migrantes atendidos en el municipio proceden de la republica de venezuela.


Tabla 80 Población migrante atendida según afiliación al SGSS

Regimen de afiliación	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial	%	Total de migrantes con atenciones en salud en la entidad territorial de referencia	%
Contributivo		0.0	407	16.5
Subsidiado		0.0	94	3.8
No afiliada	5	100.0	1790	72.7
Particular		0.0	165	6.7
Otro		0.0		0.0
En desplazamiento con afiliación al régimen contributivo		0.0	1	0.0
En desplazamiento con afiliación al régimen subsidiado		0.0		0.0
En desplazamiento no asegurado		0.0	5	0.2
Sin dato		0.0		0.0
Total de migrantes atendidos	5	100	2462	100

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

La totalidad de migrantes registran sin aseguramiento en salud.

Figura 61. Régimen de afiliación de la población migrante departamento Huila y municipio de Algeciras 2019.



Fuente: Base de datos SISPRO 2020.

2.2.7 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria

Se realiza un análisis descriptivo para los eventos de notificación obligatoria, La información no aporta datos significativos, en relación departamento – municipio donde se evidencia la mayoría en 0 (cero).

Se analizará la magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria, a continuación se enlistan.

Tabla 81. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Municipio de Algeciras, 2006 – 2018

Causa de muerte	Algeciras	Huila	Comportamiento															
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
Causas externas																		
Accidentes biológicos																		
Accidente ofídico	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lesiones y muerte por accidentes de tránsito	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ambientales																		
Vigilancia de la exposición a contaminantes atmosféricos relacionados con ERA	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos adversos de los servicios de salud																		
Infecciones asociadas a la atención salud	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones																		
Exposición a flúor	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboral																		
Lesiones en menor trabajador	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental																		
Conducta suicida	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia escolar	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia																		
Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No transmisibles												
Ambiental												
Vigilancia entomológica	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer												
Cáncer (mama, cérvix)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cáncer infantil	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cardiovascular												
Enfermedades cardiovasculares ((isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas e insuficiencia cardiaca; diabetes mellitus insulino dependiente, la asociada con desnutrición, otras especificadas y diabetes mellitus no especificada; enfermedades respiratorias crónicas de vías inferiores, bronquitis crónica simple y mucopurulenta, bronquitis crónica no especificada, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, estado asmático y bronquiectasia)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congénitas												
Defectos congénitos	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades raras	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materno perinatal												
Bajo peso al nacer	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Embarazo en adolescentes	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morbilidad materna extrema	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad materna	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad perinatal y neonatal tardía	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prematuridad	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVE	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mental												
Consumo de sustancias psicoactivas por vía endovenosa	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nutrición												
Vigilancia del estado nutricional en menores de 18 años	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mortalidad por y asociada a desnutrición en menores de 5 años	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasmisibles												
Ambiental												
Complicaciones geo-helminthiasis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ebola	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergentes												
Resistencia antimicrobiana * antibióticos	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inmunoprevenibles												
Difteria	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evento adverso seguido a la vacunación	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis Neisseria meningitidis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis por Haemophilus influenzae	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda (menores de 15 años)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parotiditis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarampión-rubeola	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Síndrome de rubeola congénita	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos accidental	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos neonatal	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tosferina	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varicela	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Materno perinatal												
Sífilis gestacional	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sífilis congénita	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remergentes y olvidadas												
Oncocercosis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peste (bubónica/neumónica)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tifus	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceguera por tracoma	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión aérea y contacto directo												
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección Respiratoria Aguda	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado)	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepra	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis pulmonar	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis extrapulmonar	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis Todas las formas	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis tuberculosa	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión sexual y sanguínea												
Hepatitis distintas a A	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIH/SIDA	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brucelosis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chagas crónico y agudo	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisticercosis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dengue grave	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encefalitis: nilo occidental, equina del oeste, venezolana	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de origen prionico	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre amarilla	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis cutánea	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leishmaniasis mucosa	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptospirosis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: vivax	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malaria: falciparum	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rickettsiosis	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmitida por alimentos/suelo/agua												
Cólera	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedad Diarreica Aguda por rotavirus	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis A	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ETA	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vectores												
Chikungunya	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia sanitaria												
Uso y consumo												
Consumo de antibióticos	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasas de incidencia PDSP												
Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia	140.00	178.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de ocurrencia	1.96	6.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de leptospirosis	0.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de Chagas	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de incidencia de sífilis congénita	5.38	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SISPRO, 2020

2.2.7.1 IRAG por virus nuevo

A partir del archivo de si muestras se obtiene panorama de usuarios con diagnostico presuntivo de influenza humana por virus nuevo.

Tabla 82 Casos de presuntivo de influenza por virus nuevo según género y edad 2020.

Edad	Femenino	Masculino	Total general
0-4	32	26	58
5 a 9	17	27	44
10 a 14	14	18	32
15-19	24	27	51
20-24	61	50	111
25-29	82	61	143
30-34	66	57	123
35-39	63	40	103
40-44	42	27	69
45-49	44	21	65
50-54	50	43	93
55-59	64	39	103
60-64	55	33	88
65-69	57	26	84
70-74	78	63	141
75-79	47	52	99
80 y mas	57	89	146

Fuente SISMUESTRAS

Del total de registros el 55% corresponde a población femenina y el 45% restante a población masculina, con respecto al grupo de edad los más afectados corresponden a de 25ª 29 años, de 70 a 74 años y de 80 y más.

Tabla 83 Resultado muestra para virus nuevo 2020

NEGATIVO	POSITIVO	TOTAL, GENERAL
1241	312	1553


Fuente SISMUESTRAS

El 80% de los casos resultados como presuntos son descartados según resultado de PCR, el 20% resulta positivo. De los casos positivos el 48% corresponden a población femenina y el 52% restante población masculina.

Análisis a profundidad de Peor Situación

Con respecto a la incidencia los indicadores se evidencia diferencias significativas con el comportamiento de los eventos de dengue clásico y dengue grave para la vigencia 2018, donde se reportaron indicadores superiores a los reportados a nivel departamental.


FIGURA 62 Tasa incidencia Dengue Algeciras-Huila



Fuente SISPRO 2020

El Municipio de Algeciras ha presentado, un comportamiento fluctuante a través del periodo verificado, encontrando picos en los años 2010 y 2016, con indicadores que superan ampliamente el comportamiento del evento a nivel Departamental.

FIGURA 63 Tasa de Incidencia Dengue Grave Algeciras-Huila



Fuente SISPRO 2020

El Municipio de Algeciras ha presentado, un comportamiento fluctuante a través del periodo verificado, encontrando picos en los años 2010 y 2016, con indicadores que superan ampliamente el comportamiento del evento a nivel Departamental, en el año 2016.

Tabla 84. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del Municipio de Algeciras, 2006 – 2018

EVENTO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
875 - VCM, VIF, VSX	0%	0%	0%	0%	0%	11%	8%	14%	18%	10%	28%	41%
300 - AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA	27%	1%	8%	2%	3%	8%	10%	13%	10%	8%	18%	19%
210 - DENGUE	17%	11%	4%	62%	4%	47%	32%	21%	27%	35%	13%	8%
110 - BAJO PESO AL NACER	0%	0%	0%	0%	0%	3%	1%	2%	1%	1%	2%	2%
113 - DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	4%
831 - VARICELA INDIVIDUAL	0%	36%	39%	8%	37%	8%	16%	5%	8%	8%	10%	4%
356 - INTENTO DE SUICIDIO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	5%	3%
360 - INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS	11%	10%	18%	9%	20%	3%	2%	3%	4%	3%	4%	2%
549 - MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	0%	0%	0%	0%	0%	2%	2%	3%	4%	2%	2%	2%
560 - MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDIA	4%	3%	5%	1%	3%	3%	1%	1%	1%	1%	2%	2%
414 - INTOXICACION POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	0%	0%	0%	0%	3%	2%	8%	10%	3%	1%	1%	2%
370 - INTOXICACIÓN POR FÁRMACOS	2%	6%	2%	2%	3%	0%	1%	1%	2%	1%	1%	1%
412 - INTOXICACION POR MONOXIDO DE CARBONO Y OTROS GASES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
620 - PAROTIDITIS	0%	1%	1%	1%	0%	1%	0%	1%	1%	0%	1%	1%
735 - ANOMALIAS CONGENITAS	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%	1%	1%
750 - SÍFILIS GESTACIONAL	4%	2%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%
820 - TUBERCULOSIS PULMONAR	2%	1%	1%	1%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%


Fuente: *Aplicativo SISPRO 2019.*

Para el año 2018 en el municipio de Algeciras, el evento de notificación obligatoria con mayor peso porcentual en el Municipio es la violencia contra la mujer, intrafamiliar y/o sexual con el 41% del total de los casos, presentando un preocupante ascenso con respecto al año 2017, seguida de la exposición a animales potencialmente transmisores de rabia con 19%, y el dengue con el 8%, con una reducción del 5% en el número de casos.

2.2.8 Análisis de la Población en Condición de Discapacidad 2020.

A continuación, se realiza un análisis a las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.

Figura 64. Pirámide de la Población en Condición de Discapacidad, Municipio de Algeciras 2020



FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad.

Para el análisis de la información se utilizará como base de datos el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Información de la Protección Social SISPRO.

En la siguiente figura se observa que la mayor carga de alteraciones y discapacidad en la población del Municipio de Algeciras, se registra en edades avanzadas, con una mayor carga en personas con 80 años y más; La población masculina cuenta con un porcentaje más alto que la femenina.

Tabla 85. Distribución de las Alteraciones Permanentes por Año en el Municipio de Algeciras 2020.

Tipo de discapacidad	Personas	Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	892	50.83
El sistema nervioso	580	33.05
Los ojos	588	33.50
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas	167	9.52
Los oídos	313	17.83
La voz y el habla	377	21.48
La digestión, el metabolismo, las hormonas	56	3.19
El sistema genital y reproductivo	108	6.15
La piel	31	1.77
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)	35	1.99
Ninguna		0.00
Total	1755	

*Corte 27 agosto de 2020.

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100% Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social

Para el año 2020 a cohorte 20 de septiembre, se evidencia un aumento en el registro de discapacidad a nivel municipal en comparación con el año anterior. En la tabla anterior se aprecia que la mayoría de alteraciones de discapacidad, corresponden a personas con discapacidad en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con el 50.8%, seguida de personas con discapacidad en los ojos, con el 33.5%, la discapacidad en el sistema nervioso también registra una considerable cantidad de población.

Tabla 86. Distribución de las Alteraciones Permanentes por Grupo de Edad y Sexo, Municipio de Algeciras 2018

GRUPO EDAD	FEMENINO		MASCULINO		NO DEFINIDO		R - NO REPORTAD	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
De 0 a 04 años	14	2%	11	1%				
De 05 a 09 años	40	5%	55	6%				
De 10 a 14 años	40	5%	74	8%	1	25%	2	50%
De 15 a 19 años	38	5%	69	8%			1	25%
De 20 a 24 años	58	7%	52	6%				
De 25 a 29 años	44	5%	42	5%				
De 30 a 34 años	33	4%	49	5%				
De 35 a 39 años	42	5%	34	4%				
De 40 a 44 años	42	5%	33	4%				
De 45 a 49 años	29	3%	47	5%				
De 50 a 54 años	55	7%	55	6%				
De 55 a 59 años	62	7%	50	5%				
De 60 a 64 años	61	7%	60	7%				
De 65 a 69 años	64	8%	73	8%				
De 70 a 74 años	52	6%	49	5%				
De 75 a 79 años	47	6%	46	5%				
De 80 años o más	110	13%	114	12%				
No Reportado			3	0%	3	75%	1	25%

FUENTE: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad. 2020

En la distribución por género se encuentra que el 53% de las personas con discapacidad pertenecen al género masculino y el 47% restante al femenino, El grupo de edad con la mayor proporción de casos son los mayores de 80 años, no se evidencian diferencias significativas en la distribución de grupos de edad en los dos géneros.

2.2.9 Identificación de Prioridades Principales en la Morbilidad.

Tabla 87. Prioridades Identificadas en la Morbilidad, Municipio de Algeciras 2018.

Morbilidad	Prioridad	Huila 2018	Algeciras 2018	Tendencia	Grupos de Riesgo (MIAS)
General por grandes causas	1. Enfermedades No transmisibles	1868978	32230	Tendencia a la disminución	000
	2. Transmisibles y nutricionales:	347773	5903	Tendencia a la disminución	000
	3. Condiciones mal Clasificadas	452965	7305	Tendencia a la disminución	000
	4. Lesiones	184240	2539	Tendencia a la disminución	012
	5. Condiciones Materno Perinatales	69004	707	Tendencia a la disminución	008
Específica por Sub causas o subgrupos	1. Enfermedades genito-urinarias	287899	5423	Tendencia al aumento	000
	2. Enfermedades Musculoesqueleticas	232678	3271	Tendencia al aumento	009
	3. cardio-vasculares	305678	6278	Tendencia al aumento	012
Alto Costo	Tasa de Incidencia de VIH Notificada			Tendencia al aumento	007
Precusores	1. Prevalencia de diabetes mellitus		1,0	Tendencia a la disminución	001
	2. Prevalencia de hipertensión arterial		4,50	Tendencia a la disminución	001
Eventos de notificación Obligatoria ENO's	1. Tasa de incidencia dengue clásico según municipio de ocurrencia		179,06	Tendencia a la disminución	00
Discapacidad	El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas	45	50.8	Tendencia al aumento	00
	Los ojos	33	33.5	Tendencia al aumento	00
	El sistema nervioso	7	33	Tendencia al aumento	00

Fuente: *Aplicativo SISPRO 2020*

CONCLUSIONES

Para el municipio de Algeciras la morbilidad que presenta la mayor magnitud, para la población total por grandes causas, son las enfermedades no transmisibles, que aportaron el 66% de los eventos, seguido en su orden de las condiciones mal clasificadas con el 14.6%, las enfermedades transmisibles con el 12.2%, las lesiones con el 5.2% y las condiciones materno-perinatales con el 1.5% sin cambios importantes en relación con la vigencia 2018.

En los subgrupos, la morbilidad en la causa de condiciones transmisibles y nutricionales; las infecciones respiratorias son las que más se presentaron, presentando para el año analizado una disminución de 10.6 en comparación con el año anterior.

En el grupo de las enfermedades no transmisibles siguen siendo la principal subcausa de morbilidad las enfermedades cardiovasculares, las que presentan mayor morbilidad en género femenino y masculino.

Para el grupo de lesiones la mayor morbilidad la presentó los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias, el cual mantiene la tendencia durante el periodo evaluado es el subgrupo que más morbilidad ha presentado.

La morbilidad por salud mental para el municipio de Algeciras se destaca como primera causa, los trastornos mentales y del comportamiento, que aportaron el 76% de los eventos de salud mental en el año 2019, los ciclos de vida más afectados son infancia y vejez.

El comportamiento de la enfermedad renal crónica para el municipio, el 92% de la población diagnosticada se encuentra en el estadio 0.

Para los eventos de alto costo, la tasa de incidencia notificada por VIH, presentó una tasa de 27,98, superando la del departamento, es el único año que el municipio registra incidencia por este evento. La incidencia por la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o remplazo renal por 100.000 afiliados y la tasa de incidencia de remplazo renal presentan tendencia más baja que el departamento.

Para los eventos precursores, en el municipio la prevalencia de diabetes mellitus y la hipertensión arterial presentaron tendencia a la disminución comparado con el año anterior.

El dengue presenta un comportamiento en sus indicadores superiores a los reportados por el Departamento del Huila.

Para la población con Discapacidad, la afectación del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas son el tipo de discapacidad que más afecta a la población del municipio, seguido de los ojos, afectaciones al sistema nervioso la mayoría de la población con discapacidad se encuentra en la población mayor de 80 años.

2.2.10 Análisis de los determinantes sociales de la salud – DSS

2.2.10.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud, se estimaron una serie de indicadores que corresponden a circunstancias materiales que intervienen de manera directa en la dinámica salud – enfermedad de la población del municipio de Algeciras; estos indicadores están conformados por cinco subgrupos los cuales son: condiciones de vida, disponibilidad de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, psicológicos y culturales y el sistema sanitario.

Tabla 88. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida

Determinantes intermediarios de la salud	HUILA	ALGECIRAS
Cobertura de servicios de electricidad	96.5	89.70
Cobertura de acueducto	72.2	81.50
Cobertura de alcantarillado	62.0	75.10
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)	22	16.00
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-DANE)	17	23.60
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNP-DANE)	8	17.90

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

Tabla 89 Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del Municipio de Algeciras, 2019

Determinantes intermedios de la salud	Cabecera	Resto
Cobertura de servicios de electricidad	100	81.00
Cobertura de acueducto	95.6	0.00
Cobertura de alcantarillado	88.1	0.00

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

Condiciones de vida

- **Cobertura servicio de electricidad:** La cobertura en la zona urbana es del 100%, mientras que la zona rural no cuenta en su totalidad con el servicio.
- **Cobertura de Acueducto:** La cobertura del acueducto en la zona rural se encuentra totalmente ausente.
- Cobertura de alcantarillado: La cobertura del acueducto en la zona rural se encuentra totalmente ausente.
- Disponibilidad de alimentos

Tabla 90. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Algeciras, 2006 – 2018

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	Algeciras	Comportamiento													
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-DANE)	7	4.76	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: en la proporción de bajo peso al nacer, este indicador se encuentra por debajo del indicador departamental, con tendencia a la disminución, en comparación con el año anterior, en el municipio.

Factores Psicológicos y Culturales (Forenses)

Tabla 91. Tabla. Factores Psicológicos Y Culturales Del Municipio de Algeciras 2018

Determinantes intermedios de la salud	Huila	Algeciras	Comportamiento														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018)	70,99	31,10
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018)	145,72	96,38

Base de datos SISPRO 2019

La Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y la Tasa de incidencia de violencia contra la mujer, fue menor que la del departamento, para el municipio estos dos determinantes con tendencia a l aumento.

Sistema Sanitario

Tabla 92. Tabla. Sistema Sanitario (10 Indicadores) Municipio de Algeciras 2019

Determinantes intermedios de la salud	HUILA	ALGECIRAS	Comportamiento																
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE)	8.7	1.60																	
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE)	4.9	4.70																	
Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)	80.4	99.40																	
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos (MSPS)	92.5	97.10																	
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92.3	103.00																	
Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS)	92.3	103.00																	
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS)	93	109.80																	
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal (EEVV-DANE)	92.5	93.00																	
Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)	98.5	97.70																	
Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE)	98.7	97.40																	

Fuente: Base de datos SISPRO 2020

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia:** El porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de cuidado de la primera infancia en el Municipio de Algeciras, se estiman en 1.6% muy por debajo de las estimaciones departamentales.

- **Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:** La proporción de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud se estima en 4.7% indicador que se encuentra levemente inferior con respecto a las estimaciones departamentales, aunque no se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los indicadores; importante establecer planes y programas de gobierno que mejoren la accesibilidad de la población para acceder a estos servicios.
- **Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud:** La cobertura de afiliación al SGSSS de la población del municipio de Algeciras se estima en 99.4%, evidenciándose un importante crecimiento con respecto a la anterior vigencia y encontrándose el indicador por encima de las estimaciones departamentales.
- **Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos:** La cobertura de vacunación con BCG para nacidos vivos del municipio de Algeciras para el año 2019 fue de 97,1%, con cobertura útil; evidenciando superando la meta departamental
- **Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año:** La cobertura de vacunación con DPT en la población menor de 1 año del municipio de Algeciras en el año 2019 fue de 103%, mostrando una cobertura útil en vacunación.
- **Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año:** La cobertura de vacunación con Polio en la población menor de 1 año del municipio de Algeciras para el año 2019 fue de 103%, mostrando una cobertura útil en vacunación, además de evidenciar la administración de este inmunobiológico en conjunto con la DPT.
- **Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año:** La cobertura de vacunación con triple viral en la población menor de 1 año del municipio de Algeciras fue de 109%, dando cumplimiento a meta departamental.

- **Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal:** La proporción de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal se estima en 94%, indicador que muestra un leve incremento con respecto a la vigencia anterior.
- **Cobertura de parto institucional:** La cobertura del parto institucional en el municipio de Algeciras se estima en 97,71%; indicador que muestra igual comportamiento con el indicador departamental.
- **Porcentaje de partos atendidos por personal calificado:** En el municipio de Algeciras el 97.4% de los partos fueron atendidos por personal calificado; indicador que presenta un comportamiento similar al departamental.

Servicios Habilitados IPS

El municipio de Algeciras cuenta con el hospital Municipal que presta sus servicios como entidad primaria de salud.

Tabla 93. Tabla. Servicios Habilitados en la IPS del Municipio de Algeciras Huila 2018

Fuente: Base de datos SISPRO 2019

Tabla 94. Tabla. Situación por Régimen y Aseguradora, Municipio de Algeciras 2018

MUNICIPIO	Po. TOTAL (DANE) 2018	CONTRIBUTIVO	EXCEPCION	SUBSIDIADO	TOTAL AFILIADA A SALUD	PORCENTAJE
Algeciras	24.662	1.271	285	20.550	22.106	89,64%

Fuente: BDUA Excel, Aseguramiento Huila, Corte 31 de diciembre 2018.

Tabla 95. Tabla. Otros Indicadores del Sistema Sanitario en el Municipio de Algeciras 2018

Indicador	2015	2016	2017	2018
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes	0,12	0,12	0,12	0,12

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes	0,12	0,12	0,12	0,12
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes	0,08	0,08	0,08	0,08
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Razón de camas por 1.000 habitantes	0,28	0,28	0,28	0,28

Fuente: *Aplicativo SISPRO 2019.*

2.2.10.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud

Cobertura Bruta de Educación

Tabla 96 Determinantes intermedios educación

Eventos de Notificación Obligatoria	HUILA	ALGECIRAS	Comportamiento																
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE)	9.3	17,3																	
Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria (MEN)	109.9	111.60	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario (MEN)	113	97.40	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media (MEN)	81.9	64.79	-	-	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Fuente: SISPRO, 2020.

Con respecto a los indicadores de educación el Municipio presenta un indicador de analfabetismo muy superior al reportado para el departamento.

Fuente: *Aplicativo SISPRO 2019.*

Pobreza (NBI) Necesidades Básicas Insatisfechas.

Tabla 97. Tabla. Necesidades Básicas Insatisfechas, por Área, Municipio de Algeciras Huila

Total						
Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
19.67	4.16	8.41	4.07	3.32	1.92	6.89

Cabeceras						
Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
18.70	5.08	10.97	4.30	3.60	1.39	4.72


Resto						
Prop de Personas en NBI (%)	Prop de Personas en miseria	Componente vivienda	Componente Servicios	Componente Hacinamiento	Componente Inasistencia	Componente dependencia económica
20.62	3.25	5.89	3.83	3.05	2.44	9.04

Fuente: Datos Censo 2005

- **Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas:** El municipio presenta una proporción de necesidades básicas Insatisfechas del 19.67%, siendo levemente mas alta en la zona rural.
- **Proporción de población en miseria:** La población en estado de miseria es del 5.08% en la cabecera municipal y 3.25% en el resto del municipio lo cual debe de ser una prioridad para la instauración de planes y política de gobierno dirigidas a mitigar esta problemática.
- **Proporción de población en hacinamiento:** La proporción de población en hacinamiento del Municipio es de 3.60%, en el área urbana y 3.05 en el resto del municipio.
- **Tasa de desempleo**


En el año 2017, el departamento del Huila presentó una tasa global de participación de 60,8%, la tasa de ocupación fue 52,2% y la tasa de desempleo fue 9,2%, aumentando en 0,4 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en el año 2017 (8,7).

Figura 65. Tasa de Desempleo del Departamento del Huila 2007 -2018



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

Figura 66. Tasa de Subempleo Objetivo y Subjetivo, Departamento del Huila 2007 - 2018



Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares

En el departamento del Huila para el año 2018 La tasa de subempleo objetivo fue de 11,7%, presentando aumento en relación al año 2017 y la del subempleo subjetivo fue de 34,6%, esta tasa con tendencia a la disminución.

3. CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; e identificar los municipios que se encuentran en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados a través del documento por el método del Índices de Necesidades en Salud.

3.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente

Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, para delimitar su definición debe ser formulado como una situación negativa que debe ser modificada, se debe definir la población afectada, consecuencias y magnitud expresada de acuerdo con los indicadores estimados en los capítulos uno y dos.

3.2 Priorización de los Problemas de Salud.

Después de revisar la información disponible y pertinente, se realiza un listado de las situaciones de riesgo por cada una de las dimensiones analizadas para el Municipio de Algeciras. Los problemas se definen en términos operativos, como situaciones desfavorables que ameritan transformación.

Tabla 98. Priorización de los problemas de salud Municipio de Algeciras, 2018.

Dimensión Plan Decenal	Prioridad	Grupos de Riesgo (MIAS)
1.Salud Ambiental	1. Alto porcentaje y presencia permanente de mordedura por animal potencialmente transmisor de rabia.	0
	2.Déficit de agua potable en las zonas rurales del municipio	0
	3.Inadecuada eliminación de excretas en la zona rural	
2. Vida saludable y condiciones no transmisibles	1.Incremento de la enfermedades Cardiovasculares	0
	2.Aumento de la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón	0
	3.Aumento de la tasa de homicidio	0

3. Convivencia social y salud mental	1. Trastornos mentales y del comportamiento	12
	2. Epilepsia	12
	3. Alta presencia de VCM, VIF Y VSX	
4. Seguridad alimentaria y nutricional	1. Alta prevalencia de bajo peso al nacer.	0
	2. Prevalencia de obesidad en hombres y mujeres de 18 a 64 años	0
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos	1. Aumento de la tasa de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años	0
	2. Aumento de la mortalidad por tumor maligno del cuello del útero	9
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles	1. Aumento de las IRAG	1
	2. Aumento de las enfermedades infecciosas intestinales	1
7. Salud pública en emergencias y desastres	1. Falta de conciencia social en el desarrollo de acciones tendientes a disminuir los riesgos antrópicos	13
	2. Falta de recurso humano capacitado en el manejo de urgencias, emergencias y desastres a nivel institucional.	13
8. Salud y Ámbito laboral	1. Alto índice de trabajadores informales sin afiliación al sistema general de seguridad social en salud.	11
	2. Baja cobertura ocupacional de manera directa. (No continuidad de los procesos).	11
9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables	1. Aumento de personas con discapacidad	0
	2. Aumento en la tasa de población Víctimas del conflicto armado.	0
	3. Alta presencia de analfabetismo en el Municipio	
	4. presencia de deserción escolar	
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria	1. Mejorar en los procesos de evaluación en salud pública a nivel municipal.	0
	2. Continuidad de los procesos de atención de APS	0

Fuente SISPRO